

醫學入門

五卷上

#1336609111
v. 10

編註醫學入門

五卷上

婦人

經候

五葉

崩漏

六帶下

八癥瘕

十胎前

十七臨產

二十產後

附胎前禁忌胎後所忌房中禁神
生子所忌方截胎衣方

小兒

十五觀形

十七察脉

十九五臟形症虛實相乘

一死症

三十乳子調護

胎毒類

三十初生

四十撮口

五十噤口

五十臍風

附胎風

六十胎驚夜啼

七十諸驚

七十癇瘵

三十客忤

四十天釣

四十內釣

五十疝氣

六十變蒸

七十龜胸龜背

附解顛顛填顛陷滯順

八十五軟五硬

九十丹毒

附胎瘡

內傷乳食類

五十吐瀉

三十五疳

八十諸積

二十外感

四十諸熱

五十瘧

九十癘

柳絲絲

年如斯

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

翠正

編註醫學入門外集卷之五

△婦人門

○經候

經病百端血滯枯

婦人以血為主，天真氣降，至癸水合腎氣全盛，血脈流行，常以三旬一見，以象

月盈則虧，故日月經行與產後一般。若其時餘血一點未淨，或外被風寒及濕冷暑熱邪氣，或內傷生冷七情鬱結，為痰為瘀，凝積於中，曰血滯。或經止後用力太過，入房太甚，及服食燥熱，以致火動邪氣盛而津血衰，曰血枯。良方云：經後被驚，則血氣錯亂妄行，逆於上則從口鼻而出，逆於身則水血相搏，變為水腫。悲怒則氣血逆於腰腿心腹背脇手足之間，重痛經行則發，過期則止。怒極傷肝，則有眩暈嘔血癰癰血風瘡瘍等病。加之經血滲漏於其間，遂成竅穴，生瘡淋瀝不斷，濕熱相搏，遂為崩帶。血結於內，變為癥瘕，凡此變症百出，不過血滯與枯而已。但血滯亦

有虛熱血枯亦有虛熱故重則經閉不通以滯宜破血枯

補虛

血滯經閉宜破者原因飲食熱毒或暴怒凝瘀積痰

也若氣旺血枯起於勞役憂思却宜溫和滋補或兼有痰

火濕熱尤宜清之涼之每以肉桂為佐若熱則血行也但

不可純服峻藥以屬陰道至於耗氣益血之說雖女科要

法但血為氣配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降

氣行則行氣滯則滯如果鬱火氣盛於血者方可單香附

九散抑氣散常加木香檳榔枳壳以開鬱行氣若氣亂則

調氣冷則溫氣虛則補男女一般陽生則陰自長氣衰則

血亦涸豈可專耗其氣耶論者多泥叔和血旺氣衰不知

叔和論肝肺二脈則宜肝旺於肺其實氣血平和有孕故

繼曰兩臟通和但婦人見偏性鄙婢妄志不得伸鬱怒無

時不起故香附為女入仙藥經曰邪滯因外感傷冷鬱行

氣盛則實正氣奪則虛可不悟諸

登則風寒入內以致凝滯者小溫經湯經行適來續得寒

熱就閉不通或寒或暑俱謂之熱入血室小柴胡湯加生

地或黃芩芍藥湯加生地經行過食生冷或外被冷濕以致瘀血凝結者五積散去麻黃加牡丹皮紅花○七情心氣鬱結不行者分心氣飲去羌活半夏桑皮青皮加川芎當歸香附我木玄胡索有火者更加黃芩或小調經散單香附也有盛實次宜疏氣血盛實經絡過閉或時挾痰者或燒存性紅花當歸煎湯下枯傷勞食或作泄胃氣弱體倦發熱腹痛腸鳴飲食減少而不生血者補中益氣湯加川芎生地天花粉有腸鳴月水不來者病在胃胃虛不生血氣宜單厚朴五錢空心水煎或單蒼朮膏水泄少食者升陽益胃湯無泄少食者二陳湯加白朮黃芪便製香附當歸芍藥牡丹皮麥門冬山查麥芽因飲食積者更加我木枳壳濕痰胃熱分胖癰海地位經閉者導痰湯加川芎黃連不可服地黃泥腫故也如用須姜汁炒過○胃熱消渴善食漸瘦津液為熱燥渴者宜瀉胃熱四物湯合調胃承氣湯各玉燭散再合涼膈散各三和散輕者小柴胡湯合四物湯去人參半夏加天花粉○素

虛形瘦口燥善食厚味鬱為痰火有潮者逍遙散加黃芩

無潮者四物湯加桃仁紅花或加味養榮丸大槩肥人多

氣弱有濕痰瘦人血怯有火脫血入房胞氣竭少年大脫血或醉後入

人多血怯有火脫血入房胞氣竭房氣竭肝腸月事衰少

者身或產育過勞劬瘵及多產育傷血或誤服汗下

賊丸或產育過勞劬瘵及多產育傷血或誤服汗下

十全大不通木槩只如此庫熱痰氣四症而已不調亦大

補湯血氣流通更有凝滯然後可用紅花當歸散紫葳散通經

丸導經丸之類虛者只用當歸散以通之通後又須養血

益陰使津液流通苟不務氣血充和而惟以毒藥攻逼是

求千金於乞丐必死而後已○以上言經水不通以下言

經水不調前後色何如以期言之對期者性和血足易挾

不調或只差二三日者亦不為害以色

言之心主血陰從陽故以色紅後期來少血不足後期二

為正雖不盡期而色正者易調後期來少血不足後期二

為血虛四物湯加參芪白朮陳皮升麻瘦人只是血少四

物湯倍歸地少加桃仁紅花肥人多痰二陳湯加南星蒼

術

木滑石芍歸香附。○來少色和者四物湯點滴欲開潮煩
脉數者四物湯去芍地加澤蘭葉三倍甘草少許十味香

附丸肉寒血溢來少或日少五六日以一上者四物湯加桃仁紅花牡丹皮藥花先期來多血有餘

先期三五日者為血熱四物湯加麥連肥人加痰藥先十
數日者血氣俱熱也四物湯加黃芩柴胡香附肥人清海

蒼朮丸加黃連白朮○來多或日多五六日以上者內熱
血散也四物湯加麥朮瘦人有火者固經丸肥人多痰者

清海蒼朮或前或後氣血亂或前或後或多或少或逾月不
至或一月再至當歸散調經散

單丹淋瀝不斷邪未疎時行時止淋瀝不斷腹中作痛乃
參散寒熱邪氣客於胞中留滯血海外

疼也如有積下利不定有所去則愈臍下逆氣上攻胃膈
欲嘔者桃仁散或用當歸四錢乾漆三錢蜜丸服如腰膈

腹痛者牛膝散或行或止心痛者失笑散經水適來通斷
往來寒熱者先服小柴胡湯加地黃後以四物湯和之有

月事頻數者四物湯倍芍藥加黃芩有經行不止者風熱
四物湯加地榆阿膠荆芥熱者倍黃芩或吞固經丸

色紫甚則黑淡因痰滯濕模糊色紫者風也黑者熱甚也

以混之也如烟塵水如屋漏水如豆汁或帶黃混濁模糊

者濕痰也或塊作片色不變者氣滯也或風冷乘之也色

變紫黑者血熱也○大槩紫者四物湯加防風白芷荆芥

黑者四物湯加芩連香附淡白者古辛歸湯加參芪白芍

香附有痰者二陳湯加芎歸如煙塵者二陳湯加秦艽防

風蒼朮如豆汁者四物湯加芩連成塊者四物湯加香附

玄胡索枳壳陳皮隨症選用○通用

琥珀調經丸百子附帶丸墨附丸 外症潮熱內腹痛水

循環鐵病不作而有子若兼潮熱重則加之咳血汗嘔或

瀉有潮汗則血愈消耗有咳嘔則氣往上行瀉則津偏於

後夜則積結於中是以必先祛病而後可以滋血調經就

中潮熱疼痛尤為婦女常病蓋血滯積入骨髓便為骨蒸

血滯積於中與日生新血相搏則為疼痛血枯不能滋

養百脈則蒸熱於外血枯胞絡火盛或挾痰氣食積寒冷

外邪則為疼痛○潮熱有時為內傷為虛無時為外感為

實虛者大溫經湯熱者四物湯加柴芩經閉者滋血湯骨

蒸者大胡連九、大烏雞丸五、心潮者四物湯加黃連、胡黃連、無汗者茯苓補心湯有汗者逍遙散、經前潮者血虛有滯、逍遙散加牡丹皮、桃仁、玄胡索、經後潮者血虛有熱、逍遙散去桑葉、胡黃連、地骨皮、加生地、便炒黃芩、此方能加減、退熱聖藥有咳加桑白皮、貝母、桔梗、知母、麥門冬、咳血加生地、山梔、牡丹皮、嘔吐加陳皮、半夏、旋覆花、嘈雜加姜炒黃連、或芩連二陳湯、尋常潮熱者腎氣丸、大造丸、或四痛滯物湯料加便炒黃芩各一兩、四製香附一兩、密丸服、痛滯

經前虛後呼

此言腹痛也、經事欲行、脘腹絞痛者、為血滯、四物湯料四錢、加玄胡索、苦楝木、香櫞、各

一兩、痛甚者、萬痛丸、經水臨行時痛者、為氣滯、烏藥湯、氣

滯血瘀者、大玄胡索散、或四物湯加桃仁、紅花、莪朮、玄胡

索、香附、木香、發熱加柴胡、經水將來、陣痛陣止者、為血實、

四物湯加玄胡索、木香、黃連、香附、腰腹痛者、內補當歸丸、

經水將行、腹風冷、相博繞臍痛者、乃寒氣客於血室、大

溫經湯、杜枝、桃仁湯、經水已來時痛者、四物湯加陳皮、玄

胡索、牡蛎、皮、甘草、○經後痛者、為血虛、八物湯、小烏雞丸、

歷年血寒、積結、胞門嘔吐、經暗、胎前腹痛、陰冷、微引腰脊、

而痛者，酒煮當歸，太溫經湯。○通用水腫，經前血腫後

交加，地黃丸，滋陰百種丸，七製香附丸。

經水斷而後睡，名曰血分，乃瘀血化水，閉塞胞門，此水腫

更難治，但能調其經，則水自消。小調經散，香歸丸，先浮腫

而後經水不通，名曰水分，乃脾不能制水，水并浮肌肉

為之，虛腫。紅粉丸，用腎氣丸，水分，君澤瀉，加防已，葶藶

木通，一分，君壯筋骨，加牛膝。血風身痛痺皮膚，血風乃氣

紅花，百經，閉，用雄雞者，桑皮散。血風身痛痺皮膚，血虛而震

風，冷，身體，壓節，痛，大，等，藥，散，麒麟竭丸，起痛散，血虛丸

經閉，身，痛，濕，熱，濕，熱，甚，也，四，物，湯，加，蒼，木，陳，皮，牛，膝

甘草，水，煎，服，間，用，蒼，波，丸，加，蒼，耳，白，芍，經，生，期，者，蒼，波

丸，加，蒼，耳，白，芍，龜，板，金，毛，狗，脊，經，後，期，者，蒼，波，丸，加，蒼，耳，白，芍

痒者，四物湯，加荆芥，或古烏荆丸，肌肉頑麻者，烏頭丸，上

攻頭目，暈倒者，單蒼耳，散頭項脊痛者，柴胡調經湯，頭身

痛寒熱咳嗽怔忡一切雜症，人參荆芥散，素養胃通心真

虛者，女金丹，史國公浸酒方，胎前產後皆同。要法：經曰二陽之病發心脾，蓋衝為血海，任主胞，胎二陽

起於胞內，為經絡之海，與手太陽小腸手少陰心為

表裏主上為乳汁下為月水月水乃經絡之餘衝任氣盛則血依時而下憂思耗傷心血以致火炎血不歸肝而出納之用已竭母念子虛脾亦不磨而食少食少則肺金失養水絕生化之源而經閉不調治者須知心為氣血之主心氣鬱結者宜調心血通心經而血自行脾胃為氣血之運飲食勞倦損其中氣以血少不行或行之間斷者只宜平胃散四君子湯之類補養脾胃而氣血自生自運乃標本兼治法之良者也
室女扶陰抑寡居
女子十四衝任盛而月事下必近二十方可匹配可見陰氣之難成也或思食鹹酸煎炒熱燥以致氣血上壅不通者紅花常歸散散寒散單大黃膏如逾年未嫁或年未及而思男思傷心血火炎脾虧肺燥腎枯而血閉成痞者十分難治宜四物湯加黃芩柴胡或逍遙散加山梔參以養血涼血降火或腎氣丸加子芩紅花養陰栢子丸亦好
因怒逆者因製香附丸加黃芩生地因驚者抱膽丸經絕不通者產後散○寒婦鬱悶百端或暴夫不能頓忘或門戶不能支持或望子孫昌盛心火無時不起加之飲食厚味遂成痰火其症惡風體倦作寒作熱面赤心煩或時自

汗肝脉弦長當抑肝之陰氣柴胡抑肝湯抑陰地黃丸是
 變丸如貧苦淡食者四製香附丸主之有每日上午神思
 昏憤怕見明處惡聞入語至午後方可及頭昏腹痛驚悸
 稍涉勞動與月經來時其症尤劇此不得遂志之故也宜
 清神養榮四物湯加入參茯神陳皮柴胡羌活甘草香附
 有與鬼交通者由神不守舍或時獨笑或泣脉遲伏或如
 雀啄不知度數顏色不變者宜茯神羌活蔓荊子防風
 意苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃芩甘草水煎服

崩漏

崩漏有虛亦有熱熱則流通虛漏泄血熱則流虛則漏凡

謂之漏下忽然暴下若山崩然謂之崩中有五色以應五臟虛多勞傷挾火邪經行犯

後過度損傷衝任氣血俱虛不能制約經血忽然暴下宜
 大補氣血大溫經湯氣虛者四物湯加參芪血虛者四物

湯加膠艾炒乾姜又不止者百子附歸丸墨附丸虛寒臍
 腹冷痛者伏龍肝散一切虛症內灸散虛火涼血地黃湯

生地、芩、連、湯、補、陰、丸、久、者、
當、歸、龍、骨、丸、太、小、烏、雞、丸、
熱、只、飲、食、不、調、
步、有、因、膏、滋、厚、

下、流、於、腎、與、相、火、合、為、濕、熱、迫、經、下、漏、其、色、紫、黑、腐、臭、宜、

解、毒、四、物、湯、涼、血、地、黃、湯、膠、艾、四、物、湯、加、黃、芩、或、單、芩、心、

丸、四、物、坎、離、丸、固、經、丸、○、有、因、飲、食、失、節、火、乘、脾、胃、下、陷、

顏、容、似、無、病、若、外、見、脾、肉、倦、煩、熱、不、卧、等、症、經、水、不、時、暴、

至、或、適、來、適、止、只、宜、聖、善、脾、胃、加、以、鎮、墜、心、火、或、因、四、氣、

之、藥、補、食、瀉、腸、自、止、升、陽、調、經、湯、升、陽、建、經、湯、或、因、四、氣、

苦、相、侵、
子、宮、為、四、氣、相、傳、則、血、亦、難、停、大、厥、風、冷、搏、動、者、

五、積、散、去、瘀、黃、入、醋、煎、服、或、不、換、金、正、氣、散、加、川、

芎、官、桂、或、四、物、湯、加、荆、芥、○、寒、冷、所、乘、及、年、老、久、崩、者、伏、

龍、肝、散、加、附、子、鹿、茸、阿、膠、蒲、黃、糯、米、糊、丸、服、○、暑、月、單、芩、

心、丸、或、益、元、散、加、百、草、
或、為、悲、憂、心、痛、切、
悲、哀、甚、則、胞、絡、

霜、○、濕、者、升、陽、除、濕、湯、
絕、胞、絡、絕、則、陽、

氣、內、動、發、則、心、下、崩、數、漉、血、也、宜、倍、金、散、四、製、香、附、丸、烏、

藥、湯、古、橘、歸、丸、○、憂、鬱、因、生、心、火、後、貧、先、順、後、逆、心、事、不、足、

鬱、火、旺、於、血、脉、之、中、宜、四、物、湯、加、香、附、白、木、各、一、錢、地、榆、

黃、芪、各、參、各、五、分、升、麻、二、分、甚、者、加、棕、櫚、灰、酒、調、服、○、心、

痛甚者名殺血心痛小產後血過多心痛者亦同用烏賊魚鱗炒為末醋湯調服勢急須宜止且

行經曰陰搏陽謂之崩言屬熱者多也崩乃經血錯亂不循故道淖溢妄行遇止便有積瘀凝成窠白不止又恐

昏暈必先服五靈脂末一錢其性能行能止然後分靈熱用調和氣血之藥一二貼後再服單五靈脂散去故生新

如更不止烏紗帽散十灰散古黑神散單夏枯草膏有火者同純九厘者女金丹養胃安心還舊

血崩止後宜四物湯加炒乾姜調之氣弱加參芪有瘀血加香附按火加芩連少許更服二宜丸四物湯以還舊

血免致孤陽防其再發如脾胃氣弱者補中益氣湯心神不安者寧神膏滋陰寧神湯此疾有心血不足者有心火

亢甚者若不早治變為白濁白淫血枯發熱不可治矣

帶下

帶下赤白皆濕熱臍腹痛甚濕熱結經曰小腹窵熱澀出白液窵者濕熱屈抑

凝滯結於任脉自胞上而過帶脉出於大小腸之分淋瀝
以下故曰帶下赤屬血白屬氣其症頭昏目眩口苦舌乾
咽澀大便或閉或瀉小便澀皆熱症也如赤白痢濁一般
但不痛耳間有痛若濕熱恍惚甚則肚腹引痛婦人服食
燥熱性行非戾以致肝旺脾虧而生濕熱熱則流通古人
有用導水丸下之繼以淡劑滲之或苦練丸大玄胡索散
調之如臍腹痛者暫以辛溫開道如天
溫經湯補經固其湯龜柏莖柏丸是也熱多瘦婦必潮煩
瘦人多熱脈數各症潮煩乃陰虛火盛也芡柏樗皮丸帶
不止者用地骨皮一兩生地五兩酒十盞煎至三盞分三
次服或白芷散草益母丸○白帶兼痛風者二陳湯加蒼
栢南星牛膝川芎兼頭風鼻涕者蒼栢辛芎散兼七情者
側柏樗
濕勝肥黃痰作孽肥人多濕身黃脾緩陰戶如水
皮丸或痛白帶升陽燥濕湯四炒固
真丹○濕痰流下滲入膀胱宜二陳湯加二木升麻柴胡
或蒼栢樗皮丸如結痰白帶淋瀝不已者先以小胃丹半
錢半飽津液下數丸候鬱積開服芩朮芍藥丸○通用五
苓散合四物湯或單樗白皮炒為末酒糊丸血虛加四物

湯氣虛加參朮陳皮火動加黃柏滑久加龍骨赤石脂性燥加黃連腹瀉加乾姜問有虛寒帶臭

腥陰中冷痛何曾歇虛因月水淋瀝不已或崩中暴下或產後去血過多以致陰虧陽竭榮氣

不升經脈凝泣衛氣下陷精氣累滯於下焦蓄積而成白

滑如涕下流腥臭若黃芪建中湯去桂加當歸水煎吞苦

練九久不止膈腹引陰冷痛者東垣固真丸虛中有火者

補經固真湯大烏雞丸常用氣虛四君子湯血虛四物湯

有火加黃柏有寒加桂附○寒殆因亡血復亡其陽陽氣

虛極帶下腥臭多悲不樂附桂湯腰痛陰冷者四物湯加

桂附常用酒煮當歸丸小烏雞丸龜斯丸琥珀調經丸外感風邪傳各經

經脈流傳臟腑若傷肝經青如泥色心經赤如紅津肺經

白形如涕脾經黃如爛瓜腎經黑如衄血宜胃風湯或五

積散去麻黃主之一種白淫思慮切思想無窮所願不得

通用單地榆散意淫於外入房太甚

證為筋痿久為白淫謂白物淫如白精之狀不可誤作白

帶過服熱藥又有日夜流津如清米泔或如黏膠者謂之

白崩與白淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補鎮
心丹因思傷脾胃者四七湯下白九子或歸脾湯痞悶少
食者沈香降氣湯因勞傷腎氣心腎不交者
金鎖正元丹小兒胎子丸威善丸硫石丸

室女胎產法

相同

室女經水初下一時驚悸或浴以冷水或當風取涼
故經水止而即患帶下宜琥珀硃砂丸○孕婦帶下

全，是濕熱宜芩朮樗皮丸○平時陰陽過多及產後亡血

下，虛風邪乘虛入於胞絡宜煖宮丸加姜附吳萸或黃芪

建中湯去桂加當歸補衛調脾散凡崩中帶下或用升

歸水煎吞苦練丸補衛調脾散凡崩中帶下或用升

用水滋和伏龍肝散白芷散然暫止而終不止者蓋衛司

開闔而為榮血之主脾胃為血海水液之會衛氣與胃氣

俱虛則血液無所紮制是以古方有用桂枝湯加附子以

固衛氣者四君子湯加草菓丁香木香以燂水健脾胃者或

用理中湯加陳皮半夏或單半夏丸用苦歸煎湯下或補

中益氣湯平胃散皆補衛厚脾使氣血自循故較而不專

於收澁也

却奪之也

頭男子積
衆條參看

癥者堅而不移レ痕者
堅而能移レ七癥八痕

癰瘡冷熱都是瘀或因食積或鬱怒癰者堅而不移瘰者
經亦不詳雖有蛇咬蟹肉髮鼠米等名偶因食物相感假
血而成形耳瘰止癰稍輕其為病所以異於男子者皆由
產後及經水行時或飲食生冷以致脾胃虛弱與臟氣相結或
七情氣鬱生痰皆必挾瘀血而後成形要知瘰瘡瘰癧石
瘰腸覃食癥血癥食瘕血瘕種種不一盡皆痞塊之異名
耳○經云大腸移熱於小腸小腸移熱於大腸兩熱相搏
則血溢而為沃瘕日事不利以此推之瘰瘡皆有熱者蓋
瘀血亦有熱燁逼成況陽氣慤火蘊聚飲食濕熱怫鬱結
成未可專以寒冷論也太極虛冷者內灸散琥珀丸溫白
丸熱者消塊九連蘇九外貼三聖膏神效阿魏散久不愈
者猪肝丸辰砂一粒丹神聖代針散○瘰血四物湯加桃
仁韭汁甚苦者加蜀葵根入玄明粉下之或桂枝柳仁湯外
以韭菜搗餅裂痛處或萬痛丸挑女散○食積三棱煎保
和丸紅丸子虛者白朮膏蒲中益氣湯熱者大承氣湯加

黃連分藥川芎乾姜甘草或單黃連丸小調中湯加貝母
姜汁糊丸服○鬱氣白葱散蟠葱散七製香附丸當歸龍

會丸○痰飲潤下丸或二陳湯加香附
枳壳桔梗痰癖食積者白芥丸海石丸
腹痛經閉如懷胎

面黃寒熱夢無數癥瘕得冷則發腹痛支滿胃脇腰背相

氣甚盛令人恍惚夜多異夢寒熱往來四肢不舉陰中生

瘡甚難小使淋瀝或兼帶下小腹重痛面色黃黑入於子

臟則絕產入於胞絡則經閉宜參荊芥散小溫經湯道

遙散通經丸古疾文丸選用○血氣併心腹痛連腰脇

背脊甚則搖擻經候不調謂之血氣玄胡索散手拈散

先笑散單乾漆丸數症因痰瘀氣積者與上諸方通用

疰病治類相同疰者在腹內近臍左右各有一條筋脉急

在兩肋之間有時而痛各目癖皆陰陽不

和飲食停滯冷氣相搏而成亦得冷則發腹脹不食亦可

紅丸子猪肝丸小

烏雞丸葱白散
腸覃可按血自通
大腸與胃相搏大

石山塞

女子癥瘕病氣發則腹痛逆氣上衝乃胞中傷損瘀血結成久則堅硬如石塞於子宮大如懷

魏
冊
主

血蟲氣蠱堅如石水蠱腫滿俱難治

蟲者三
虫聚而

仁煎肉

漸消除

善治癰瘕者調其氣而破其血消其食而豁其痰衰其大半而止不可猛攻峻

黃元調

之凡攻擊之藥病重病受病輕胃氣受之而傷矣
或云待塊消盡而後補養則胃氣之存也幾希

胎前

胎前清熱與養血

婦人無病月事時下乃能受孕氣血充實則可保十月分婉子母無虞若備任

不克偶然受孕氣血不足榮養其胎宜預服八珍湯補養

氣血以防之免其墜墮或原有熱而後受孕或孕後挾熱

火七情勞役動火輕則胎動不安重則遇三五月七陽月必

火能消物故也宜安胎丸常服以清其熱熱清則血循

經而不妄行所以養胎也諺

云胎前不宜熱良有以哉

月分依經善調燮

各經氣血多少虛實

不則胎孕不安依經調之

一足厥陰二少陽

夫人之有

血室方開父之精潮適至陰幕既翕如布袋紋紐而精血

冲氣自然旋轉不息如蠅螂之滾糞吞啖含受成一團

圓旋機九日一息不停然後陰陽大定玄黃相包外似繩

絲環瑤其中自然虛成一竅空洞虛圓與鷄子革中一穴

相似而圓圓之外氣自凝結為胞衣初薄漸厚如彼米飲
豆漿面上自結二皮中竅日生從無入有精血日化從有
入無九日之後次九又九凡二十七日即成一月之數
自然凝成一粒如露珠然乃太極動而生陽天一生水
之胚足厥陰脉所主也此月經閉無潮無痛飲食稍異平
日不可觸犯及輕率服藥○又三九二十七日即二月數
此露珠變成赤色如桃花瓣子乃太極靜而生陰地二生
火謂之脾足少陽脉所主也此月腹中或動或不動猶可
狐疑若吐逆思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物乃一
臟之虛如愛酸物乃肝臟止能養胎而虛也二三箇月間
忽心腹痛不安者用當歸三錢
阿膠甘草各二錢葱四莖煎服三四月胞絡三焦訣又三九
日即三月數百日間變成男女形影如清鼻涕中有白絨
相似以成人形鼻與雌雄二器先就分明其諸全體隱然
可悉斯謂之胎乃太極之乾道成男坤道成女手厥陰脉
相火所主胎最易動古本木湯或為丸頻服最妙如無惡
阻等症胎有可疑者用驗胎法以川芎為末一錢五更艾
湯服後腹中不覺動者則為經病如覺微動者則為

有孕或因驚恐墜胎氣不和轉動不能臍腹疼痛者溫酒調下二錢加當歸尤妙如胎不安及腰背痛不可忍者

古桂續丸○四月男女已分始受水精以成血脈形像具

六腑順成手少陽脉所主多心腹膨脹飲食難消甚者用

平胃散換白朮加香附烏藥大腹皮如因驚怒動胎下墜

小腹引腰痛小便便疼痛下血者安胎當歸湯四五箇月

忽心腹疼痛若用大棗十四枚炒黑益一錢燒赤為末取一撮酒調服之立愈五脾六胃七肺金

五月始受火精以成陰陽之氣筋骨四肢已成毛髮始生

足太陰脉所主○六月始受金精以成筋口目皆成足陽

明脉所主五六月胎不安者安胎飲固胎飲選用○七月

始受木精以成骨皮毛已成遊其魂能動左手手太陰脉

所主如胎氣不安常憂者八手陽明成竅穴○八月始受土

亦名阻胎宜旋覆花散○九手陽明成竅穴精以成皮膚

胎不安者單砂仁罌炒為末米飲下止痛行氣甚捷但非

八九箇月不可多服

如胎大者束胎丸

九腎十膀神氣完以成皮毛百節

畢備二轉其身足少陰脉所主○十月受氣足五臟六腑
齊通納天地氣於丹田使關節人神皆備足太陽脉所主
惟手少陰太陽經無所專主者以君主之官無為而曰此
兩月素難產者達生散素肥盛及奉養安逆太過者於其
散素怯弱皆益氣救生散半產須防三七月半產多在三五箇月及七箇月內若前次三箇月而
墮則下次必延期後然凡半產後須多服養氣血固胎元
之藥以補其虛損下次有胎先於兩箇月半後即服清熱
安胎藥數貼以防三月之墮至四箇半月後再服八九貼
防過五月又至六箇半月後再服五七貼以防七月及至
九箇月可間有感傷并雜症妊孕傷寒詳見三卷○尋常
保無虞間有感傷并雜症感風咳嗽頭痛發熱參蘇飲
去半夏熱服令肌體微潤而已風熱甚者雙解散去硝黃
麻黃石羔○感寒胃滿欲嘔苦腹滿痛大便清者大止氣
散去半夏加吳萸阿膠○感暑敗胃煩渴尿赤驚惕嘔吐
臍下苦急者香茹散合古莽朮湯或十味香茹散○感濕
腹脹身重者平胃散泄者三白湯加砂仁厚朴蒼朮內熱
加黃芩○內傷七情氣滯不行者紫蘇飲○內傷勞役以

致小腹常墜甚則子宮墜出者氣陷也補中益氣湯如因
房勞者八物湯加酒炒黃芪為君防風升麻為使○內傷
飲食即脇滿痛者平胃散換白朮如山查麥芽黃連○內
傷姜椒熱酒腥膻炙燂以致胎熱令母兩目失明頭痛腮
腫項強者消風散或四物湯加芩連荆防○內傷生冷米
血或外又感寒以致胎冷不轉胎腹絞痛腸鳴泄瀉者宜
從權以理中湯之劑治之泄甚加木香訶子陳皮白芍粟
米中病即止○因感傷以致胎虛寒者八物湯加吳萸阿
膠○雜病與男子一同但孕婦服藥禁忌不犯則不動胎
如子虛熱多清脾散去半夏夏寒多人參養胃湯去半夏又
不愈者勝金散截之胎痢熱者古芩朮湯黃芩湯虛者胃
風湯香薷散凡傷冷瘧痢交作者醒脾飲子胎驚心中怔忡
仲時即不寧熱者硃砂安神丸虛者定志丸餘可類推調
治須知三禁法 婦人天癸未行屬少陽天癸已行屬厥陰
天癸已絕屬太陰胎產之病治厥陰經者是但化之源也治無犯胃氣及上二焦為三禁不可汗下
利小便便是也汗則痰滿下則傷脾利小便則亡津液舊以

四物湯為主如傷寒各經加減法例莫若外感時氣從四
物湯合小柴胡湯陰症四物湯合理中湯古本湯傷寒
最難雜病四物湯四君子湯二陳湯加減間有服毒藥而
不致胎動者乃病邪重胎元實也豈可視為常法且陰陽
不和而後有胎凡胎家有病亦不必太攻也經曰婦人重身
毒之有故無殞然衰其大半而止如陰陽調和者不可妄
服藥餌三五月前一毫辛散滑利禁用七八月間倘有
秘結乃敢滑利又當審其素體墮胎及難產而斟酌之
胎動心腹腰作疼甚則下血如經行或因七情氣不順或

因外感風寒凝受胎不堅或因驚恐或因喜怒不常或因
衝任二經原挾風寒而受胎或因登廁風

冷攻入陰戶以致胎動而母心腹作痛甚則腰痛下血當
安胎而母自定○胎動因七情氣逆心腹脹滿疼痛者紫

蘇飲因外感發熱頭痛嘔逆胃脘脹滿者安胎飲加柴胡
大腹皮氣血虛者安胎飲倍參木虛熱者固胎飲○腹痛

服安胎藥不止者須辨寒熱虛實寒者理中湯加砂仁香
附熱者黃芩湯血虛胎痛者四物湯或平胃散加蘇蘆煎

湯香二宜丸氣虛痛者四君子湯加芍藥當歸氣實心腹
脹痛者用香附枳殼等分爲末空心白湯下○心痛寒者
艾葉小茴川練等分空心水煎或草豆蔻丸熱者二陳湯
去半夏加山桅黃芩○心腹痛素有冷氣腹痛衝心者不
利者四物湯去地黃加茯苓厚朴人參吳萸桔梗枳殼其
水煎服心腹太痛氣欲絕者古芍歸湯加茯苓厚朴等
分水煎服單方用鯉魚如食治入大棗十四枚炒鹽一錢
酒少許煮汁飲之不飲酒者用鯉魚和粳米煮葱煮粥十
日一食善能護胎長胎○腰痛最爲緊急酸痛者必欲產
也因七情者紫蘇飲加杜仲續斷因悶者用破故紙二
錢爲末胡桃肉一箇研勻空心酒調服素虛痛者青娥丸
腰痛如折不能轉側者用鹿角五錢火煨酒淬再煨再淬
以碎爲度研末酒調服○胎動下血者膠艾芍歸湯或加
砂仁秦艽卷柏桑螵蛸桑寄生杜仲下血腹痛難忍或下
黃汁如漆如豆汁者用野苧根金銀花根各五錢水酒或
各一盞煎服下血產門痛者用單黃連末一錢酒調服或
因母病或壓墜有因母病以致胎動者祖治母病而胎自
寔矣如母有宿疾而胎不旺者長胎白朮

凡有羸瘦挾痰氣血枯竭胎終不可保者用牛膝四分瞿麥桂心各二分為末空心溫酒調服下之免害其母

單方用紅酒麴五兩清酒十盛煎二沸去渣分五服隔宿勿食次早再服其子如糜令母肥盛無疾或麥芽神變並

好尋常古昔歸湯最妙孕婦或從高墜下重物所壓觸動胎元心腹痛甚下血者用砂仁黑炒勿焦為末熱酒煎

湯艾湯皆可調服覺腹中熱其胎即安胎家無所健脾養不洽功同艾木如去血過多者古昔歸湯加膠艾

血總安寧通用古昔木湯加阿膠風邪加生薑豆豉寒加葱白或乾生薑少許熱加天花粉寒熱加柴胡

項強加葱白熱熱腹痛加白芍腹脹加厚朴下血加艾葉地榆腰痛加杜仲驚悸加黃連煩渴加麥門冬烏梅思慮

過加茯神痰喘加旋覆花半夏夏熱勞役加黃芪氣喘去白朮加香附便燥加麻子仁素懶難產加枳壳蘇葉素慣墮

胎加杜仲素血虛加芎歸此安胎之聖藥也凡卒有所下急則下日三五服緩則五日十日一服常服安胎易產所

生男女又無胎毒蓋妊孕脾土運化遲滯則生濕濕則生熱故用黃芩清熱以養血白木健脾以燥濕安胎丸金匱

當歸散加味養榮丸
皆此方而推之也

胎漏下血腹不痛

心腹痛而下血者為胎動不痛者為胎漏

血多為熱少為虛

或金匱當歸散加味養榮丸血黑成片者三補丸加香附

白芍○血虛來少者古膠艾湯或合四物湯長胎白朮丸

○氣虛者四君子湯加黃芩阿膠因勞役感寒以致氣虛

下血欲墮者芎歸補中湯或下血如月信以致胞乾

子母俱損者用熟地炒乾姜各二錢為末米飲調服

惟有

犯房難救止

胎漏亦有肥盛婦人月水當來者或因登廁

選用瀉藥治之反墮惟犯房下血者

乃真漏胎也八物湯加膠艾救之

偶然尿血莫糝糊血

自尿門下血胎漏自尿門下血如血如月信以致胞乾

物湯加山梔髮灰草若實桑飲亦妙因暑者益元散加升

麻煎湯下稍虛者膠艾四物湯久者

用龍骨丁錢蒲黃五錢為末酒調服

惡心阻食名惡阻

或大吐或時吐清水惡聞食臭由子宮經絡路於胃口故逢食氣引動精氣衝

上

必食吐盡而後精氣乃安亦有誤

交合而子宮纖盛者過百日則愈

瘦人多熱肥人痰陳

湯加竹茹生薑熟加芩連因

悉若黃連丸茯苓煎湯下亦有無陰并氣弱

無陰則嘔若左脉必

弱頭疼全不入食若八物湯合二陳湯加枳梗

氣弱若四

君子湯加陳皮麥門冬厚朴竹茹日久水漿不入口吐清

水者並加丁香香惡聞食氣

或因胎動別症兼

三四月月病

多卧少起者旋覆花散

惡阻者多因

胎動不安或兼腰腹疼痛者保胎飲兼瘧痢口中無味及

曾傷風冷者醒脾飲子燕傷食者二陳湯加砂仁香附或

單白朮為丸或單砂仁為末

米飲下甚者紅丸子極効

子煩燥悶亂心神火盛尅肺好生頭

妊孕心煩燥悶謂之

月間指火用事或應天令五六月間君火大行俱能乘肺

以致煩燥胎動不安大抵相火盛者單知母為末蜜丸丸

實大每三九酒下日月未足欲產及難產者亦効看火盛者單黃連丸心神不安者硃砂安神丸煩甚恐傷胎者單

胎散功不可下或有停痰胃膈滯亦令煩燥不宜久或有停痰積飲

以煩煩藥治滿於胃膈之間亦令煩燥胎動不安者用茯苓防風麥門冬黃芩等分竹葉煨半水煎入竹瀝調服

子懸心腹脹滿痛胎氣奏心相火開妊孕四五箇月以來相火養胎以致胎熱

氣逆奏心胃膈脹滿疼痛謂之子懸宜此紫蘇飲有青心腹脹滿甚者加莪朮及丁香香少許不食者古本湯倍白朮

加芍藥甚則悶絕欲傷人火盛極一時心氣悶絕誤藥子死

不能動此症兩尺脉絕者有誤服動胎藥子死腹中則增寒手指唇爪俱青全以舌為症驗古芍歸湯救之

胎水遍身虛腫浮妊孕經血閉以養胎胎中挾水濕與血相搏濕氣流溢故令面目肢體遍身浮

腫名曰胎水又曰子腫多五六箇月有之原因煩渴引飲太過或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水血化為水所制宜

五皮散倍加白木為君氣喘小使不利者防已散腹大異

常亦堪憂妊孕五六箇月腹大異常高過心胃氣逆不安

形體殘疾或生下即死子母難保宜鯉魚湯服至腫消水散為度仍常煮鯉魚粥食之又有脚腫或

出水胞漿大盛故下流妊孕七八箇月以來兩脚浮腫頭

易產名曰鰕脚腫甚者平胃散加木瓜換外感者橫蘇散

白脚面腫至膝腿喘悶妨食甚至足指間有黃水出者謂

之子氣宜天仙藤散如脚腰腫者腎着湯手脚腫

者用赤小豆桑白皮等分水煎服重者加商陸

妊孕中風名子癰只因體薄受風寒發則口噤痰涎壅有

時昏暈胎難安體虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒

人時醒時作謂之兒暈又曰子癰又曰瘞甚則角弓反張

小續命湯意重者羚羊角湯輕者四物湯加葛根牡丹皮

秦艽細辛防風竹瀝痰加貝母陳皮茯苓甘草或古勞活
散如中風寒犯觸身體盡疼乍寒乍熱胎不安常苦頭眩
痛遶臍下寒時時小便白如米泔或青黃寒慄腰苦冷痛
日視瞢瞢若四君子湯去茯苓加當歸厚朴非白姜煎入
酒調服○不醒人
事者華荊芥散

子淋溺澀膀胱熱

雄孕飲食積熱膀胱以致小便閉澀又
謂之子滿宜古勞湯加木通麥門冬

人參甘草燈心

臨月加滑石為君熱甚者五淋散○原因

房勞內傷胞門衝任虛者

四物湯合六君子湯或腎氣丸

其則大小便閉結

臟腑積熱太便不通者用赤茯苓枳壳
等分大腹皮甘草葶半葱白煎服或四

物湯加黃芩厚朴枳壳○胞熱小便不通身重惡

寒頭眩若用冬葵子赤茯苓等分為末米飲調服轉胎

閉痛難當

轉胎若胎系轉戾臍下急痛小便不通多稟弱
性急厚味者有之○雄孕胎為胎盤展在一邊

胎系轉戾但升舉其胎胎轉水道自通宜四物湯合六君

子湯去茯苓探吐以提之無孕者亦同不可專用滑漆之

藥○有素肥盛忽瘦兩尺脉絕者陰虛也腎氣丸主之甚
 者冬葵子赤茯苓赤芍等分水煎入髮灰少許○有熱者
 古本木湯合益元散服之○丁法將雄孕倒豎起其胎不
 墜其溺自出○產後有胎轉或胎出者搗葱白於臍上灸
 之立効如欲服遺尿赤白宜分別雄孕遺尿古方用白薇
 白芍等分爲末每三錢
 藥與胎前大同
 酒調服然亦有虛有熱未若葛根湯古本木湯加山
 茱萸五味子少許白者屬虛安胎飲或鷄腔散

子瘖腹鳴自笑悲雄孕三五箇月以來忽失音不語者胞
 絡脉絕也胞繫於腎腎脉貫舌非藥可

養分後即自能言○腹中作鐘鳴或哭者多年空房下
 肩穴中土爲末酒下或乾薑之即止○腹中兒啼者黃連

煎濃汁呷之或青黛亦好○有臘燥悲傷慘戚嘔下者大
 麥甘草棗煎服○有自哭自笑者紅棗燒存性米飲調服

發痘動胎命必絕胎前患痘用峻藥動胎
 去血泄氣必死詳痘疹諸症濕痰風熱

去邪保胎真口訣孕婦脾土不運而生濕濕生痰痰生
 熱熱生風如子腫濕也惡阻痰也子

煩子淋熱也子癰風也子懸氣也轉胎虛也清熱滲濕消痰順氣踴風補虛或兼雜症去邪保胎二法並行子母俱安

飲食禁忌亦須知 雞肉合糯米食令子生寸白蟲食天

庖餼蒼食兔肉令子缺唇食羊肝令子多疳食鯊肉令子

項短縮頭鴨子同桑椹食令子倒生心寒鮮魚同田鵝食

令子瘡痘雀肉同豆醬食令子生雀子瘕食螃蟹橫生食

姜芽令子多指食水漿令絕產食雀肉飲酒令子多淫無

乳食茨菇消胎氣食驢馬肉過月難產豆醬合霍菜食墮

胎食山羊肉令子多病食鰵鱈無鱗魚難產食諸般菌生

子驚風而天食雀腦令子患雀目勿妄服湯藥勿妄用針

灸勿過飲酒漿勿藥重登高陞險心有太驚子必顛癇勿

多睡臥須時時少步動和血脉勿勞力過傷使腎氣不足

子必解顛腦破令合衣母太溫食母太飽若脾胃不和榮

衛虛損子必羸 **轉女求男皆古設** 生男生女陰陽造化玄

瘦多病戒之 **轉女求男皆古設** 妙古法於胎成二月之

內以芥置孕婦床膝下懸弓矢於壁蓋弓矢芥片男子事

也勿令人知此意恐不信者令待鵝抱卵之時以芥置巢

下盡是雄鷄故胎教常令見王公大人亦此意也更偏雄黃一二兩於孕婦身左或當花亦可三法皆驗用其一可也○又後有月日時遊胎殺雞不可泥然門戶床竈實不可輕易移動求嗣者尤宜慎之

臨產

臨產切不可荒忙十月氣足胎元壯健者忽然腹痛或只腰痛須臾產下何候於催此易生不然

之妙喜服單益母膏兒產後之患中間有體弱性急者腹痛或作或止各弄痛漿水淋瀝來少各試水雖臍腹俱痛發動露頂而腰不痛者切莫倉惶切禁洗毋動手於腹上揣摩直待日子已到腹痛陣密破水已後并腰痛眼中如火方可坐草須待兒頭直順且正逼近產門方可用力一送如坐草太早用力太過產母困倦及至遲滯乃用催生之藥凡難產皆孕後縱慾及驕恣全不運動又食生冷硬物凝滯或矮石灰子交骨不開或腹大甚胎水未盡或臨產閉結之人驚恐產婦恐則精怯精怯則上焦閉閉則氣還下焦脹而不行紫蘇飲最妙氣實者瘦胎採其散氣

者達生散活血安胎未破漿如腹痛漿水未破止宜用古苦歸

雖痛而不密宜安胎飲或達生散以固胎先切不可輕用

峻藥徒滲水道反傷胎氣而產愈難產母亦聽其眠食自

如但不可過破漿已以猶難下破水多則血乾溢必用古

睡過飽耳破漿已以猶難下黑神散血虛者古苦歸湯

下名苦歸黑神散氣弱若四君子湯下名四君黑神散橫

逆側產每加麝一釐此時如舟坐砂上須湧水而後可通

服此藥後外用葱二片搗爛鋪於小腹上用急水灘頭沙一斗炒熱將布袱於葱上輕輕壓揉滑利迅速

要相當催生有露頂順正而生猶遲滯者恐外感風冷寒

或三退六一散冬月凍產則血凝滯常令房中火煖宜催

生五積散有水道乾澀不能下及服黑神散藥又多若用

清油白蜜等分猪肝煮汁調服或六一散七錢加葵子五

錢為末每二錢熱服有產難日久水乾及觸犯惡氣心煩

燥肉若兔腦丸腰痛心煩若用入參乳香各二錢辰砂五

分為末鷄子清調羹汁化開冷服○已止正產艱難之法

分

分

分

分

已下橫逆橫生露手逆露足徐徐推上任洗娘橫者兒先露手原因

腹痛兒身未轉產母用力一區遂至橫來當令產母安然

仰卧洗母輕手徐徐推兒稍上漸漸以中指摩其肩推上

又攀其身而正之服苦歸黑神散固血生血通經兒身正

直且順臨門服阿膠滑石葵子為末溫酒入蜜攪勻服之

然後方可用力送下○逆者先露其足因下母氣之關鍵不

牢用力太早致兒逆來當令產母安然仰卧洗母徐徐推

足入去分毫不得驚恐服苦歸黑神散固血活血候兒自

順若經久不生却令洗母輕緩用手推足令就一邊直上

合兒頭一邊漸漸順下多服苦歸等藥直待兒身

轉門路正當然後用三退散調服方可用力送下坐產露

臀高攀手坐者先露其臀當高處牢繫手巾一條令產母

以手攀之服固血藥輕輕屈足良久兒即順生

嚙面貼頂救盤腸盤腸者小腸先出急用熱水浸軟舊布

水七分碗調停嚙產母面每一嚙令一縮三嚙三縮當收

盡為度又以如聖膏貼產母頭頂中心腸上即拭去內積

服苦歸參甚大補之藥加升麻防風以提之未有不收者
又久而為風吹乾不能收者用磨刀水少許火上溫過
以潤其腸後用好礞石煎湯一盞服之其腸自收
得產兒肩膊帶絆者因兒身
住其肩雖露正頂而不能生當令產母仰臥洗母輕輕推
兒洗上徐徐引手以中指托起兒頭下其臍帶服固血藥
仍須候兒身正順露額側來墜腿尻側者因兒左轉身被
左可用力送下
兒頭偏墜左眼忽偏墜右眼或露左額角或露右額角兒
頭偏墜一畔多服苦歸黑神散令產母仰臥洗母輕輕推
兒近上以手正其頭直向人門然後用力送下若是兒頂
後四月偏墜教向即令兒只露額當令洗母以綿衣灸令溫
煖用手於穀道外畔輕輕推兒頭上而正之服催生
藥後即令產母用力送下此非洗母輕手巧妙不能傷產
驚然口翻噤月而產有經一二年至四年五年而產者
盡皆倉惶用力太早之過或因子宮生時兒枕先破敗血
裹住宜益鼓一兩以青布包了燒存性入麝香一錢為末

用秤鋪純紅淫酒調服一盞者卒只以新汲水磨京墨服之墨水畏兒身出或苦歸益母草蔡心皆能逐瘀以開產路○有坐草之時暮然月翻口噤吐沫若霹靂○有矮石女子交骨不開難產者龜壳散或古苦歸湯○通用無憂散來甦胎死母舌黑非常外症指甲青黑腹悶不食口中極臭用平胃散加朴硝五錢水酒煎服其胎化或血水而下便閉脉實者大黃備急丸或單鹿角為末葱豉煎湯調服昏沉脉微者養正丹濃煎乳香湯下一二白芷丸血乾或有寒者四物湯下古桂香丸氣弱者催生五積散加麝一盞○雙胎一死一活者用

蠟八一盞甘草二兩東流水十盞煎至二盞去渣入阿膠三兩分三三次頻服能令生者安死者出○通用霹靂丹奪命丸外用如聖膏貼足心仍服催生藥及通關散吹鼻即下胞衣不下因血脹消瘀和

氣信古方皆因用力太早產下不能更用力送出胞衣

喘急疼痛者危急將帶以少物繫墜然後截斷不然則胞上抱心而死只要產母心安不可輕信洗母用手宜內

服牛膝湯催生五積散或用真血竭為末酒調服甚者奪命丹外用如聖膏貼脚心昏暈危甚八味黑神散黑龍丹

產後

產後必須先逐瘀

正產體實無病不藥可也但難產氣衰瘀血停滯非藥不行占法一產後古等

歸湯加童便一服之如無童便以淡醋磨墨一小盞入前湯藥亦好服藥後且閉目少坐然後上床仰卧不得側卧宜立膝不可伸足高枕厚厚四壁無風時以人為從心括至臍下如此三日又不可太睡熟宜頻喚醒時置醋炭或燒乾漆與舊漆器以防血迷血暈夏月房中不可太熱亦不可人多氣盛以致熱過則氣耗散而不能送血又不

可太飽時與白粥飲之日漸加與一月之內針線勞役當時不宜大害月後即成羸勞手脚及腰腿酸痛亦不可脫衣洗浴強起離床太早以致外感身強角弓反張名曰瘧風如交合陰陽令下血終身虛疾將息百日以過乃可須知產後百病皆血虛火盛瘀血妄行而已矣間有瘀消然內傷飲食外感風寒然亦必先逐瘀補虛為主

後堪補助

痰消後方可行補助如左脉弱加補血藥右脉弱

有痰血攻心即死

者食肉太早亦然痰衝眩暈腹心疼

去血過多眼花頭眩

者古考歸湯入童便甚者加炒乾姜人參汗多加黃芪或

八味黑神散單五靈脂散返魂丹○胃弱血虛發藏倉公

散白薇湯○臨症用力勞心氣虛而暈者用人參一兩蘇

木五錢水煎入童便調服○氣血俱虛痰火泛上作暈者

八物湯合二陳湯去白芍○火載血上昏暈或拔風邪者

清魂散○被驚者抱膽丸硃砂安神丸○腹心疼痛全是

瘀血八味黑神散四味散失笑散有寒熱者當歸續命散○

虛寒心痛者桂心湯感寒者理中湯○七情心痛者木檳

湯○食滯寒熱心腹痛者熟料五積散加莪朮○小腹痛

者名兒枕痛單五靈脂散或加桃仁醋糊為丸氣虛四君

子湯下血虛四物湯下○產門腫下虛痛者大

溫經湯羊肉湯○通用女金丹加味益母丸

血虛火動

寒熱互

產後血虛發熱氣虛惡寒氣血俱虛發熱惡寒切

不可發表○陰虛血弱者四物湯小熱加茯苓為

乾姜為佐去血過多外熱內煩短氣悶亂者
散蒸乳發熱者四物湯加參芪白朮天花粉發

六麻黃從劇者四物湯去芍藥量加柴胡氣
熱者補虛湯產後真不宜涼也
內傷勞後漸

長羸產後勞役過度名曰羸勞其症虛羸乍起乍止飲食
不消時有咳嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘧臂膊

拘急宜十全大補湯去芍加續斷牛膝鱉甲桑寄生桃仁
為末猪腎一對去脂膜姜一片漿三枚水二盞煎至一盞

入煎末二錢每三寸為半箇別芥五葉煎水
食滯脾家

瀉且吐傷食○食肉太早痰滯者煎料五積散痛甚加我
米區加砂仁濕加姜附人參紅瀉不止諸腹痛者理中丸

加肉豆蔻○按寒腹痛腸鳴小便清白不渴者四君子湯
合五苓散加肉豆蔻炒白芍○按熱腸鳴便澀痛一陣瀉

一陣口渴渴者四君子湯合四苓散加酒炒黃連及木通少
許或益元散○按濕身重頭眩老胃苓湯○嘔吐因敗血

乘虛入胃脹滿者六君子湯加澤蘭葉亦芍乾生薑腹脹

胃氣不和者，桔梗半夏陳皮等分，姜煎服。脾脈弦者，三白湯加乾姜陳皮黃芩滑石甘草，飲食成積痞者，內炙散。

晚丸○霍亂吐瀉煩渴，敗者理中湯加陳皮麥門冬，姜煎服。冬姜煎服者，加附子，渴者五苓散轉筋者，木黃散。

寒熱無時，停補中帶表無過度。產後外感，離床太早，或換衣襲風，入於下部，令人

寒熱似瘧，頭疼不歇，血虛者，古方歸湯加人參紫蘇乾葛。

血氣虛者，補血湯加陳皮乾姜，寒熱甚者，熟料五積散。

不止者，黃芩湯主之。如體盛發熱惡寒，及瘧痢，若小柴胡

湯合四君子四物湯加黃芪，各三分散，切，不可傷寒。

法會誤服熱藥，過多熱症大見，久而便閉者，柴胡使痰湯

或四物湯加大黃芒硝，暫服即調補之。產後傷寒，諸二卷

身痛筋攣虛渴煩。因產走動氣血，升降失常，留滯關節，筋

脉急引，或手足拘攣，遍身肢節走痛者，

越痛散或餘血不盡，流於遍身，腰脚關節作痛者，五積散

去麻黃加入參香附小茴桃仁木香等分，姜煎服。○產後

諸風癱弱筋攣無力者，血風丸或煎服。○煩渴氣虛者，生

肌散血虛者，四物湯加天花粉麥門冬，氣血俱虛者，滋頭

駭脚弱飲食無味者用人參二錢麥門冬一錢半熟地七分天花粉三錢甘草五分糯米羹藥煎服○虛煩者用人

參麥門冬小麥茯苓各一錢竹茹一彈丸半夏八分甘草五分姜煎服心虛驚悸者亦宜汗多大便偏

閉固產後發熱自汗者古歸湯汗甚加白朮防風牡蠣麥門冬熟地茯苓甘草建中湯自汗兼腫滿

者大調經散自汗肢體疼痛者當歸羊肉湯○發熱盜汗者用猪腰子一枚糯米半合葱白二莖煮米熟取清汁一

盞入人參當歸各一錢煎服○大便閉者古苦歸湯加防風枳壳甘草煎服若麻子仁丸或蘇麻粥蓋產後去血多

則難見胃弱則多汗多汗則大便閉皆血虛也醫見即血暈○小便不通腹脹滿者用益稷散臍中葱白一束切作二

指厚放蓋上以文炷灸之熱氣入腹即通○不語敗血六丁散加檳榔枳壳木通麻子仁葵子水煎服

惡痰迷產後敗血停蓄上干於心心氣閉結舌強不能言語者七珍散四味散○有臨產服湯藥過多胃氣

便然者急料五積散六君子湯○痰熱迷心不語者集痰湯或理氣鬱滯閉目不語者用生白礬末一錢熟水調服

乍見鬼神非邪作

產後乍見鬼神者由血虛勞動肝心

鬼崇也宜小調經散加龍腦少許或炒香散加當歸地黃

黃連○瘀血迷心妄言妄見及心虛語妄昏暈者入物湯

去芍藥加琥珀柏子仁遠志硃砂金銀煎服甚者黑龍府

○產後血少怔忡睡卧不寧者十味溫膽湯或寧神膏定

九又有惡露常淋淋或因時損尤難往

產後五淋白帶湯敗血淋瀝不斷者

烏金散淋久不止四肢乏力倦困者牡蠣散○有生產時

被洗毋誤損尿膀胱致日夜淋瀝者四君子湯加黃芪陳

反挑仁用猪尿膀胱煮清汁任是葶風并腫浮

產後中風各日葶風口噤

煎溫服血虛者加芎歸

牙關緊急手足痙攣及血虛強直整心眼閉生瀉或死者

犀角散古劑歸湯血虛勞碌太早風邪乘虛而入者小

續命湯若活愈風湯如口噤反張涎潮多者交加散或太

黑豆半升炒令烟起以酒二碗沃之入磁器內每用酒半

碗入獨活五錢同煎溫服○產後汗多風痺成痙者難治

○產後敗血傳蓄化水循經流入四肢浮腫者小調經散

血氣虛者四君子加蒼朮或女金丹血虛若補
庫湯少加蒼朮茯苓使水自利忌峻劑攻利一切雜症

補榮衛產後雜病與男子一同但常兼補兼滋痰則病無
不一愈丹溪云大補榮衛為主雖有雜病以未治之

是也假知月裏痢疾惡露未盡者多痰凝滯腸胃與經後
血滯作痢一同四物湯加桃仁黃連木香主之裏急甚者

通玄二八丹咳欬多是痰血入肺古二母散加
桃仁杏仁人參茯苓水煎其餘以意會之可也惟有鼻

衄黑如煤產後氣血散亂入於諸經不得還元故口鼻黑
起乃變鼻衄皆因產後血熱所致胃絕肺敗犀

角也黃湯救之發喘聲高難救護
主獨乘於肺喘急孤陽絕陰不

治之症卑人參湯或加蘇木少許救之若敗血停滯脹肺
喘者用血竭沒藥等分爲末酒入水調服兼用奪命丹

胎門腫突胎不收產後陰內兩旁腫痛手足不能舒伸者
用四生散入乳香末同搗成餅安於陰

戶兩旁良久即愈○因產用力過多陰門突出者四物湯
加龍骨末少許連進二服外用草麻子搗爛貼頂少收即

去草腐○產後生腸不收入物湯加防風升麻獨
用酒炒黃芪為君外以荊芥藿香樗皮煎湯薰洗子宮胎

膜休羞惡產後下一物如合餅狀有二皮者子宮也補中
益氣湯去柴胡連進二三大劑一響而收後以

四物湯加人參調理○產後下一物如帕約重斤餘者因
臨產勞役或肝發所致有粒席不得上者乃脾膜無妨補

中益氣湯去柴胡連進二貼即收○臨產驚動用力太過
以致育膜有傷垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛

不可忍以手微動之則痛苦欲絕先服失笑散數貼仍用
生姜三片洗淨搗爛以清油二斤拌勻炒令油乾焦為度

却用熟絹五尺摺作數層方全懸重婦人輕輕盛起肉線
使之屈曲作一團納在水道口却用絹袋兜前油姜稍溫

傳在肉線上薰之覺姜冷又用熨斗火熨熱常使有姜氣
如姜氣已過又用新姜如此薰熨一日一夜其肉線已縮

入一半再用前法越兩日肉線盡入却再服失笑散乳汁
古芍歸湯調理不可使肉線斷作兩截則不可治矣乳汁

不通血氣虛氣滯塞者戒鬱怒產後氣血虛弱乳汁少者
用鐘乳粉二錢漏蘆煎濃

湯調服或用猪懸蹄一隻通草五兩煮汁食或鯽魚木通
煮汁食亦好○氣滯乳少者滴薑散氣塞乳少者湧泉散
○無子食乳要消者用麥芽二兩炒為末四物湯調服即
止○凡乳母但覺小水短少即見病生便須服藥調理脾
胃肝腎如不愈者必氣滯且逆也蓋婦人凡事不得專行
多憂思忿怒憂思過則氣結而血亦結忿怒過則氣逆而
血亦逆甚則乳硬脇痛煩熱要之為病皆因氣血鬱結所
以古方多用香附砂仁木香檳榔青皮枳殼若行氣故也
怪疾乳長不有餘先賢治法仍詳具
產後瘀血上攻忍兩
通小腹痛正旦忍各一日乳懸危症用川芎當歸各一升水
煎濃湯不時溫服再用二升逐旋燒烟安在病人面前桌
子下令病人曲身低頭將口鼻及病乳常吸烟氣未甚縮
丹用二料則瘀血消而乳頭自復矣若更不復舊用華麻
子搗爛貼乳頭上
片時久即脫去

附胎殺禁忌

凡胎殺所在不宜修整鄰家與動孕婦當
避從不墮胎令兒破形色青腫聲寂塞大煩

胎殺所在

正月在房床二月在牕戶三月在門堂四月在

在厠戶九月在門房十月在床房十一月在爐竈十二月
在床房子丑日在中堂寅卯辰酉日在竈巳午日在門未
申日在籬下戌亥日在房巳
上禁忌總要全不修理為高下

房中遊神

癸巳甲午巳未丙申丁酉日在房內北癸卯日
在房內西申辰乙巳丙午丁未日在房內東六

戊六巳日在房中庚子辛丑壬寅日在房內南此
神所在忌安床換帳致重物於床中必主墮胎

生子所向方

子午卯酉日宜西南寅申巳亥日西北辰戌
丑未日東南難產以蘇葉煎湯洗臍腹陰門

藏胎衣方

宜生氣方上正月子方二月丑三寅四卯五辰
六巳七午八未九申十酉十一戌十二亥方

如生氣方有不便依曆日藏於奏書博士月德方
上忌月空三殺太歲方上依多置之河中者非


婦人

小兒門

觀形

察兒氣色

肝青心赤脾黃肺白腎黑凡病面無
黃色不治春怕夏黑秋赤冬黃者逆
先分部位



左頰青龍屬肝應春青右頰白虎屬肺應秋白天庭額高

而離陽應夏色心火紅主太熱青乃肝風印堂青者人驚

頭紅者三焦積熱印堂至山根紅者心小腸熱紅白者水火驚紅者痰熱印堂連准

小使赤泄山根至鼻柱紅者心胃熱大小便泄地閣頰低

而坎陰應夏色腎水承漿色青食時驚或煩燥夜啼黃多

鼻在面中應四季準頭脾應唇際紅主渴蛔虫咬心頭者

深長惡平滿黑者瀉痢死凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛

○陳氏五臟驚積冷熱詩曰肝驚起髮際肝積在食倉肝

冷唇青白肝熱正眉當心驚在印堂心積額角荒心冷太

陽位心熱而頰裝脾驚正髮際脾積唇應黃脾冷眉中岳

脾熱穴太陽肺驚髮際赤肺積髮際當肺冷人中見肺熱

面頰傍腎驚耳前穴腎積眼胞相腎冷額色紫腎熱赤食

倉紅氣見而熱痰癰盛印堂屬心紅色熱痰青色露而驚

青黑驚痰黃青風痰

風怔悸如煤之黑主方為痛中惡逆傳似橘之黃右太陽食傷文武臺

皆脾虛吐利亦有白乃痺勞為寒肺氣不利紫為熱熾變黑者死青遊

口角難醫驚狂黑掩太陽不治左太陽青驚輕紅色傷寒鼻塞變蒸壯熱黑青乳積右太

陽青驚重紅色風抽眼目黑者死紅至太陽陰者

內外有熱連文臺者熱極連武臺者漸生變症年壽赤光

平者壽多生膿血山根青黑頻見災危必死黑色痢疾赤

陷者夭多生色霍亂紅色夜

帝紫色傷飲食朱雀貫於雙瞳火入水鄉瞳熱毒黑睛

青蛇遠於四白肝乘肺部黃乃食積瀉痢而帶陽須防咳

嗽而拖藍可忌疼痛方殷面青而唇口撮驚風欲發面赤

而目竄視火紅光焰焰外感風寒金黃氣浮浮中藏積滯

而目竄視火紅光焰焰外感風寒金黃氣浮浮中藏積滯

而目竄視火紅光焰焰外感風寒金黃氣浮浮中藏積滯

而目竄視火紅光焰焰外感風寒金黃氣浮浮中藏積滯

而目竄視火紅光焰焰外感風寒金黃氣浮浮中藏積滯

乍黃乍白疳積連綿又赤又青風邪癰瘕氣入顙門成疔

紅色驚熱夜啼紅腫驚風痰熱前顙血衰頭毛作穗髮黃

虛軟母氣血弱後顙不堅父精不實

若胎熱肉折皮膚枯者死肝氣眼生眼淚脾冷涎流滯顙正口紅色為平乾燥脾熱

白主失血青黃驚積青黑者死面目虛浮定腹脹而上喘眉毛頻蹙必腹

痛而多啼久病兩眉紅者夜啼紫色者風氣二池如黃土則

為不宜風池紅有風痰將欲發搐左右兩頰似青黛則為

客忤黃色痰實紅主驚風赤者傷寒風門黑主疝而青為驚紅主

滑吉而昏黯中庭天庭司空印堂額角方廣皆命門部位青黑驚風惡候亦忌損陷手如

數物肝風將發頭者死面若塗硃心火似炙坐卧愛

暖風寒之入伸縮就冷煩熱之攻肚大脚小脾欲困而成

疳目瞪口張勢似危而必驚噫五體以頭為尊一面惟神

可恃小兒諸病但見兩眼無睛光黑睛無轉運目睫無鋒芒如魚猫眼狀或兩眼閉而黑睛朦昧者死或外若

昏困而神藏於內不脫者生黑珠滿輪睛明者少病眼白

多睛珠或黃或赤者稟弱多病目症內赤者心熱淡紅者

心虛熱者肝熱淺淡者肝虛黃者脾熱無睛光者腎虛白而混者肺熱况乎聲有輕重之不

同聲輕者氣也弱也重濁者痛也風也高減者熱欲狂也

聲急者神驚聲寒者痰聲戰者寒聲噎者氣不順喘者

氣促噴嚏者傷風驚哭聲沈不響者重聲濁沈靜者疳積如生來不大而哭聲啾啾者天啼有乾濕之

項異直聲往來而無淚者是痛連聲不絕而多淚者病之

初作必先呵欠肝所主也面赤者風熱面青者驚風面黃者脾虛多睡者內熱心神不安者氣熱熱

傷風者火之大發忽然驚叫乃火動氣虛必死夜半發藜藿

不同於膏粱毒布自殊於鮮鮪雖由外以識中勿刻舟而

求劍相兒壽夭歌身軟陽痿頭四破諸小諸高肉不就變

能踞能行能立死勝深色老性尊持方是人家長命子

察脉小兒初生至半歲看額脉週歲以上看虎口三關男子五歲女人六歲以大指上下滾持分取

三部診寸口三部脉

額脉三指熱感寒額前眉上髮際下以無名指中指食指三指按之如俱熱感寒邪鼻塞聲粗

俱冷三指吐瀉臍不安食指若熱胃中滿無名熱者乳消難

上熱下冷食中熱食指為上各指為下若食中指熱則上熱下冷夾驚名中指詳

若無名中指熱
看便是來驚之候

食指風氣命三關

男左女右以左陽右陰故也然陰陽男
女均有兩手亦當參驗左應心肝右應

肺脾於此變通消息可也故有以左手紅紋似線者發熱
驚右手紅紋似線者脾積兼驚三又者肺熱風痰夜啼
風關無珠則無病有脉病輕氣關病重命關脉紋短小而
色紅黃外症又輕則無妨若直射三關青黑外症又重者

死五色惟有紅黃安

五色紅黃紫青黑由其病盛色能加
變如紅黃之色紅盛作紫紅紫之色

紫盛作青紫青之色青盛作黑青黑之色至於
純黑者不治又白色主疳黃而不光者主脾困淡紅寒熱

在青驚積

深青色或大小曲者因足驚赤色大小曲者水
火飛禽驚紅色大小曲者小驚青帶黃者雷驚

或紅或青或線一直者是母之傷食所致此紫然
青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主慢脾風深紅疹痘是

傷寒

赤紅傷寒痘疹空紅泄瀉○錢氏歌紫風紅
傷寒青驚白色疳黑時因中惡黃即困脾端



紋

停食 紋細腹痛

多帶乳食不消紋多則主氣不和紋亂者病久紋曲者風熱盛

紋麤黑

射驚風頑

紋直者驚風惡候紋黑如墨困重難治

懸針青黑

風水驚

氣拜熱

命關人驚多傳慢脾風不治餘候此

魚刺

又有此樣刺

青色

驚風關虛

水字

風肺驚風或

疳痰積

乙字

風氣二關驚風盡

屬肝

曲直

風關肝病

積氣

大腸穢

肝

風關胃多吐

疳積總

如環

流珠點紅

疳熱三焦霍亂吐瀉腸鳴自利煩燥啼哭

長珠寒熱

腹痛夾

積團

來蛇乾嘔臟腑滯

左手則為肝病

去蛇昏睡瀉

潺湲

弓反裏

形感寒熱

頭目昏重心忪驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色

反外

心神恍惚問

夾驚夾食風癇症候紋勢彎曲入裏者病雖重而症順猶可用力若紋勢弓反出外駁弱

靠於指甲者斷不可回其有三關紋如流珠流
米三五點相連或形於面或形於身危症尤甚

裏風痺向外二斜左傷風斜右寒九八雙鈞三曲傷冷硬

脉亂如虫痒蛔攢一鎗形痰熱驚風搖二雙字食毒驚

積難

孫兒三歲至五歲一指三關定其息浮洪浮緩傷風洪緊傷寒人迎緊盛

傷寒氣口一風盛數多驚急促虛冷沉遲細實有積脉緊如

索弦是風癰沈緩須知乳化難服痰緊弦牢實大便秘沈而

數者骨中寒弦長多是膈下風弦緊者氣不和緊數驚風四肢掣

浮洪胃口似火燒卑細二痺勞洪虫嚙虛濡有氣和不更兼驚

神不守舍

熱物聚ル伏ル結ル爲ス

大小不均者鬼崇

四全

長客

六至號_ス平和_下

此是聖人

傳妙訣

傳妙訣

逆

肝風

肝風

目直

肝風

手掐捻

肝主謀故掐衣領亂捻物風甚身強反張力大瀉

虛則咬牙呵欠兼

心不受熱目連刺不搖或發搖力小俱

熱而搖利驚丸涼驚丸肺乘肝賊邪氣盛呵欠微搖法當

以腎氣丸補肝瀉白散瀉肺脾乘肝微邪多睡身重發搖

先以瀉青丸定搖然後隨所見症調治腎乘肝虛邪增寒

呵欠發搖若治膏所謂乘者猶乘車之乘五臟相乘莫測

如肝病必先治肺補腎然後審心驚搖難言合面卧煩熱

肝臟虛實而調之餘臟倣此心驚搖難言合面卧上竅

舌強欲言不能叫哭胃熱故欲合卧虛則困卧驚悸添

就涼中瀉心湯導赤散小生犀散驚溫

九肺乘心喘而壯熱瀉白散肝乘心風熱大若活湯下瀉

青丸脾乘心身熱瀉黃散腎乘心恐怖惡寒硃砂安神丸

脾困

身熱渴不食實則困睡不露睛身熱渴欲飲虛則

吐瀉風生痰

風或吐腥泄瀉白色多睡露睛四肢漸次生

脾風泄而嘔一陳湯加黃芩心乘脾泄熱體重而瀉若治

黃芩蒼朮甘草湯主之肺乘脾能食不大便而嘔嗽攢擗

大黃煎湯下亭上九腎肺燥嗽鼻乾手搯目實則喘而氣

乘脾惡寒而泄理中丸散潤之手搯目自鼻面者并枯湯主之肺只傷寒則不胃

肺熱復有風冷胃滿短氣喘嗽瀉白散大青膏主之

虛則名唇白少氣喘無厭氣哽長出少氣先服益黃散而後

元次藁蘇散阿膠散肝乘肺惡風眩胃憤嗽人參羌活散

腎乘肺增寒嗽清利百部丸脾乘肺體重痰嗽泄瀉四君

子湯加藿香乾葛木香甘草腎寒畏明顙白解腎只不足陰瘧瘡腎實

氣不充則神不足目多眵睛畏明顙顙白開面

火欲炎下竄若骨上坐惟欲墜下而縮身也足熱不喜衣覆

惡寒挂投湯加黃芩為丸肺乘腎喘嗽皮溢寒百部丸肝

乘腎拘急氣搐身寒理中丸脾乘腎體重泄瀉身寒理中

九凡本臟虛弱皆鬼賊尅害當補本臟平氣假令肺病咳嗽當春補腎當夏救肺當秋瀉肺當冬補心瀉本臟乃各寒瀉大抵五臟各至本位即氣盛不可更補到初尅位不可更瀉又肺病重見肝虛症易治見肝熱症難治蓋肺病久則虛冷肝強實而反勝也經曰受所制而不能制謂之真強法當先補脾肺而後瀉肝肺勝者當補肝瀉肺然嗽久虛弱不可服瀉白散宜腎氣丸又肝病見秋肝勝肺也宜補肺瀉肝輕者病退重者唇白如枯骨者死肺病見春肺勝肝也心病見冬心勝腎也腎病見夏腎勝心也脾病見四臟順者易治逆者難治五臟病機不離五行生尅制化之理所以有臟腑虛實乘勝之病世俗不審此理往往率指為外感內傷而用藥枉死此錢氏素古之功大矣哉

死症

眼上赤脉下貫瞳人水火困絕顙門腫起兼及作坑心絕鼻乾黑

燥肺脾絕氣肚大青筋不榮目多直視五臟俱絕靨不轉睛止指甲

黑色

肝絕

忽作啞聲

氣有出無入脉絕也

虛舌出口

心絕

齒齙咬入

絕

魚

口氣急

口如魚呿水之狀是氣急肺絕

啼不作聲

肺絕

蚘虫既出

消食

虫是脾胃冷熱

皆出

必是死形

發泄手足寒難已

手足溫易已凡病困汗

出如珠不流者死

頭毛皆上逆者死唇口

乾目皮反口中氣冷手足四

垂其卧如縛掌中冷者死

乳子調護

養子須調護

看承莫縱馳

乳多終損胃

食壅即傷脾

被厚

非為益衣單正

所宜無風頻見日

寒暑順天時

初生三五

月宜綳縛

令卧勿豎頭抱出

六箇月方可與稀粥

亦不可將乳同喫

五歲方可喫葷腥

○養子十法一要背煖二要肚煖三要

足煖四要頭涼

五要心胃涼六要

勿見異物七脾胃常

要溫八啼未定勿便

飲乳九勿服輕粉硃砂

十少洗浴

要溫八啼未定

勿便飲乳九勿服

輕粉硃砂十少洗浴

小兒病機

大半胎毒小半內傷乳食十分之一外感風寒

濕熱生痰痰生火濕熱結滯而然且真水未旺
心火獨炎故肺金受制肝常有餘脾腎不足

胎毒類

初生 撮口 噤口 臍風 夜啼 諸驚
急驚 慢驚 慢脾 馬脾 癰座 客忤

天釣 內釣 疳氣 變蒸 龜背 鮮顛 滯頤 五軟 丹毒

初生

初生何故便驚

生下啼聲未出急用絲裹手指難生耳
草汁夏月加黃連汁拭口去其惡穢積

定更以蜜調硃砂末一字抹入口中鎮心安神解毒延

生方初生臍帶落後取置新瓦上用炭火四圍燒存性若

臍帶有五分入飛過辰砂二分半為末用生地當歸煎濃

汁調勻抹兒上臍間及乳母乳頭上一二日至晚服盡為度

次日遺下穢濁之物終身胎熱胎寒胎瘦肥胎熱因母食

水無痘疹諸疾亦妙法胎熱胎寒因母

感寒或傷生冷○胎瘦候面黃白睛多喜哭身肌肉薄太
便色白屬肺宜預服長生九橫樹枳壳各一兩木香五錢
砂仁半夏丁香肉豆蔻全蝎各廿枚為末飯九黍米大每
五十九乳洗下寬上寬下補脾化痰止瀉○胎肥生下肌
膏血紅五心煩熱大便難宜用浴體法白礬青黛烏梢蛇
各一錢半天麻五分蝎梢硃砂各二分半麝香一字桃枝
一握水煎十沸溫熱浴之勿洗背胎瘦者亦宜胎寒身冷多瀉利盤腸內釣痛無
時生後身冷口氣亦冷腸鳴瀉利青黑盤腸內釣心腹絞
痛不乳者木香勻氣散或白姜散白姜木香官桂陳皮
橫樹甘草各等分嘔加木水丁香香面青肢冷去
橫樹加川芎當歸水煎量兒大小以餘熱灌之或不能啼
或腎縮有生下不能啼者必因難產月寒所致急以餘熱
之仍作大油紙撚點燈於臍帶上往來遍帶燎之蓋帶連
兒臍得火氣由臍而入更以熱醋湯澆洗臍帶須臾氣回
啼哭如常方可浴洗并斷臍帶○有腎縮者乃初生受寒
用硫黃吳萸各五錢為末研大蒜汁調塗臍上仍以蛇床

子燒烟
微薰

生泡遍身或無皮

生下遍身如魚泡知水晶碎則成水流滲者乃胎受寒濕也用

蜜陀僧為末，糝之，仍服蘇合香丸。○生下遍身無皮俱胎是紅肉都乃脾氣不足也用早米粉撲之候生皮方止。

熱懸癰落地死

有生下即死者急看兒口中懸癰前腭上有泡以手指摘破用帛拭血令淨若血入

喉即死

穀道無孔事亦奇

初生穀道無孔者乃肺熱閉於肝門急用金銀玉簪看其端的處刺

穿或用火針刺不可深以蜜酒法套住緊急只以油紙擦套住內服四順清涼散免其再合。

二便不通

因不乳

有生多面紅氣急眵淚呵欠二便不利或有血水甚則手足常攣眼常邪視身常掣跳宜連翹飲五

福化毒丹梨漿飲。○有不能飲乳者用黃連枳殼赤茯苓等分蜜乳乳汁下。○有生下面赤眼開二便不通不飲乳

者釀乳方澤瀉五分生地四分猪苓赤茯苓天花粉茵陳耳草各一分水煎冷乳母捏去宿乳服之良久乳兒此釀

乳法餘皆效此。○有卑小便不通者乃心氣積熱併於小腸急用生牛龍數條蜜少許研勻敷陰莖上內用麝香退燒

灰入硃砂磨少許為末麥門冬燈心煎湯調服○有
不乳小便難者用乳汁四合葱白一寸煎三沸灌之若

兼腹脹難支持太便不通腹脹欲絕者令婦人以溫水漱

吸唾三五次以紅赤為度便即自通生赤如丹生黃道有生下身如丹若

草天花粉葛根等分為末薄荷煎湯入蜜調服五分後用

藍葉浮萍水各同研絞汁調補硝土硃塗赤點○有生下

肌肉紅白二腫後遍身面目小便皆黃太便不通謂之血

疸因母受濕熱或衣被大煖所致宜四物湯加天花粉等

分水煎服兼以黃柏煎湯洗之鵝口口瘡急拭之白腐滿舌如鵝之口者

離薄荷自然汁拭淨如不脫用保命散拈擦硃砂各一錢

馬牙硝五錢為末每下字取白鵝糞搗水調塗舌上及頰

頰內○口瘡者心火積熱也用淡醋調南星末貼兩腳心

乳母服法心散輕者用黃連或細茶為末少加甘草蜜調

敷之甚者用黃柏青黛片腦為末竹絲調敷或前保命散

去穢糞尤妙如滿口生瘡糜爛者用黃柏細辛青葙為末

論之吐涎三日即愈大人亦宜○有口爛不能喫乳者用
巴豆二粒入硃砂或黃丹土硃少許同搗爛刺開小兒顙
門貼之如四邊起粟米泡急用溫水洗去恐成瘡用苴蒲煎湯洗之立効
心脾熱盛附舌根而重生一物如舌短小而腫曰重舌者
頰裏及上腭曰重膈着齒齦曰重齒當刺出血再刺
不爾則脹滿塞口有妨乳食宜青黛散黃連黃柏各一錢
青黛牙硝辰砂各二分雄黃牛黃硼砂各一分片腦二釐
烏朱先用薄荷汁拭口後以藥末少許塗之咽落腫塞者
亦宜○木舌心脾熱壅腫硬不和消熱塞滿口中亦能害
人用黃柏為末以竹蔥調點舌上如付硝白芷二症
通用百草霜芒硝滑石為末酒調敷之○又弄舌古絡微
緊時時舒出亦脾熱也亦可冷藥當與濕黃散兼服之面
黃肌瘦五心煩熱者胡連在太病後弄舌者肉○有初生
舌下生膜如石榴子連於舌根令兒聲不能發急摘斷之
微有血以髮灰糝之○有口內生牙齦生白點者各馬牙
不能食與鷄口不同少緩不能救急以針挑出血用京墨
磨薄荷汁以母油髮裏手指蘸墨遍口擦之勿得食乳令

見睡一時醒後與乳丹為擦之即愈
盡皆母熱遺於兒

撮口

撮口聚面氣喘急胎家熱毒入心脾
撮口風面自黃赤氣喘喘聲不出胎熱流

毒心脾則舌強唇青撮口聚面飲乳有妨
用姜蠶二枚

炒為末蜜調敷唇中或大刺驚丸或蝎梢散
蝎梢四十九

箇每箇用生薄荷葉捲定以絲扎之砂鍋內
炙炒薄荷葉

酥為度丹入姜蠶四十九箇腦麝少許為末
用紫雄雞肝

一片煎湯調服治一切胎風及百日內撮口
胎風如胎虛

冷者加川烏熱者另用辰砂膏○有初生七日
患此者急

看兒齒齬之上有小泡如粟米狀急以青軟布
裹

手蘸離溫水輕輕擦破即開口便安不用服藥
亦有脾

肺虛寒者撮口氣不和也肺主氣口屬脾脾虛
不能

榮子故撮口氣急保命丹益黃散主之
口沫

技冷不可為
口出白沫四肢冰冷最

為惡候一七見之必死

噤口

噤口不乳不能啼胎熱復為風搏之

噤口風眼閉而聲嘶小舌上聚肉如粟米

狀如乳不得口吐白沫二便皆通由胎中受熱毒流心脾故形見於喉舌或生下復為風邪搏之所致宜濕黃散珠

銀丸○有初生口禁不開不乳者用金頭赤足蜈蚣一條炙焦為末每五小分以乳汁二合和勻分三四次灌之

或用竹瀝調牛黃末一字灌之更以猪乳汁點口中此症皆因裏氣鬱吐痰利驚最

得宜噤口撮口臍風三若一種同以裏氣鬱閉宜先用控痰散吐痰蠅霜銅青各五分硃砂一錢研粉一字磨

香少許為末每一一字茶清調服或甘草煎湯探吐尤穩却以猪膽汁點入口中即愈次用人參養胃湯去蒼米半夏

加木香蘇子與乳母同吹鼻噴嚏還可治吹鼻法蜈蚣一瓦用辰砂膏利蠅自愈

噤七箇羅麥五分為末每一一字吹入鼻中噴嚏可治仍用薄荷煎湯調服七朝見此十分危朝

見此症者，危，百日内見此症，手足蹇者，亦不治。

臍風 附胎風

臍風，風冷濕氣流，臍風因斷臍後，為尿乳水瀝，臍腫腹脹。

四肢柔，其症臍腫，或多啼，搐防撮，其甚則發搐撮口，口是為內搐，不治。凡臍邊青黑小甲，黑者俱死，古方大利。

驚元主之，或用藥口條，吹鼻法，有捷可治。其甚者，金烏散，金頭蜈蚣半條，川烏尖三箇，生麝香少許，為末，每半字，金銀煎湯調服，或外科寶命丹，下捻金妙，如風搐稍定，多啼煩燥者，太。

問有熱者，生可求。臍腫千，金龍膽湯，小兒驚風。

洗臍腫法，用荊芥煎湯洗淨，後以葱葉火上炙過，候冷，指甲刮薄，貼臍處，次日便消。方服通心飲，木通連翹瞿麥山。

芩草各三分，燈心麥門冬各少許，水煎服，通心氣。

退潮熱，分水，煮薤，治旋螺眼風，如春月加防風。

退夏加茯苓車前子秋加牛蒡子升麻冬加山施連翹鉤
氣加鈎藤川練子只瘡加生地野苧根○通用安臍法治
臍中血水汁出或赤腫痛常歸烏末或白石脂末蝦蟇油
頭髮燒灰皆可敷之○灸臍筋法兒生七朝患此者必自
發山青筋下道行至臍必生兩岔待行至心不給知者常
視其青筋初發速照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處
亦照兩岔頭上截灸六炷青筋自消兒必活矣○煉臍法
藥方見第一卷凡初生下時用綿裹臍帶離肚三寸處以
線扎住却於線外將臍帶剪斷片時去線待血流盡看近
肚處臍有兩小孔一大孔用鷲毛管送煉臍藥一二分入
本孔內以手指輕輕揉散艾之臍頭三炷結作一結緒軟帛
腰裏切不可時常揭看待臍落去自無風矣又法落胎之
時視其臍軟者不須治如臍硬直者定有臍風急用銀簪
於臍根處刺破一二處入麝香末少許艾灸三炷極妙

胎風癰症多嘔吐生瘡紅色注眉頭

胎驚癰風乃孕婦喘喘
急忿怒驚撲或外挾

風邪傷胎子乘母氣生下即病嘔吐搐搦口眼闊斜驚啼
聲短眼縮顙開或頰赤或面青唇口咬牙眼合潮涎胎骨

拘攣身腰強直臍腹腫起與驚撮同症但胎風合眼
脾異不可妄用溫藥視其眉間氣色紅赤鮮碧者生青黑
黑者死治法解散風邪利驚化涎調氣辰砂膏最妙○太
乙散天漿子南星白附子天麻防風茯苓各一錢全蝎珠
砂各一錢麝香少許為末
每五分乳汁化下治胎驚

胎驚夜啼

上夜驚啼多痰熱仰身有汗赤面頰

月內夜啼驚惕抽搐者乃胎中受驚所致

宜猪乳膏塊防風各一錢硃砂五分為末用猪乳汁調
一字珠兒口中或保命丹金箔鎮心丸驚有痰者抱龍丸
驚有熱者東驚丸龍腦安神丸尋常邪熱夜啼者用燈花
三顆為末燈心煎湯調珠兒口中以乳汁送下日二服太
緊有痰熱者多上半夜仰身有汗而啼
面赤心燥小便赤澀口中與腹皆熱也
下夜曲腰必虛寒

其則肉釣手足掣

夜啼氣虛者四君子湯加山藥扁豆揆
熱加黃連升藥血虛焦啼者用當歸為

采乳汁調服氣血俱虛腹痛夜啼者用黃芪當歸赤芍木
 香耳草等分爲末每匙少許着乳頭上使吮乳服之○有
 胎寒及衣被過涼以致發寒聲腸內鈎肚腹脹痛啼則眼
 目上視手足搐掣蓋夜則陰盛寒則作痛甚則陰盛發躁
 所以夜啼宜保命丹輕者益黃散外炒麥麩之凡下半
 夜由腹而啼面自青白捫腹覺冷必冒寒腹痛也○有因
 驚風而啼而啼者二活散若活獨活各二分檳榔天麻麻
 黃甘草各一分水煎服或加南星爲末蜜調可貼額門○
 有傷乳食作痛而啼者消乳食丸
 客忤中惡哭黃昏有日夜驚啼必黃昏

中惡治詳飲乳方啼爛口舌有欲飲乳到口便啼身額皆
 後客忤條
 腫痛宜冰梅丸薄荷煎治之○凡初生月內多啼者吉胎
 熱胎毒胎驚得散且無奇疾要須頻浴凍腹便成臍風不
 息生人異物則爲客忤啼口聲重乳食重服則吐瀉痰逆
 過煖則口舌齟齬過寒則臍寒鈎氣調理之法適中而已

諸驚

神驚痰聚發風搐或因內熱風生

肝小兒元氣未充神氣未定或見生人異物

或聞厲聲響器驚入心之胞絡火炎舍空而聚痰生熱

熱生風心肝脾病也又有心內積熱而驚惕肝內生風而

發搐痰涎壅盛風熱併作所以暴烈緊急心肝病也蓋心

主熱脾主痰肝主風相因而發謂之驚風痰熱可也謂之

驚熱風痰亦可也太要驚熱者硃砂安神丸熱甚者涼驚

丸愚者溫驚丸痰甚者辰砂化痰丸抱龍丸痰熱者滾痰

丸驚風痰熱全者天麻防風丸古礞石丸○又有驚積者

受驚日久而積成之也其在額汗喘息煩渴潮熱往來吐

熱眩中覺腹內有物跳動渴下如白脂豆砂是也治法量與辰砂膏疎導仍與調氣和胃而愈

內外夾驚

成假搐不比真搐閉牙關其有搐搦反張斜視而牙關不

內傷飲食夾驚而成謂之假搐非真搐內生驚癇也○內

傷飲食壅熱或因食後遇驚謂之傷食夾驚身熱溫壯或

吐不思食大使酸臭先用入參羌活散加青皮紫蘇取效

消積次用瀉青丸加辰砂蝎梢祛風鎮驚食癖挾驚熱者

消積次用瀉青丸加辰砂蝎梢祛風鎮驚食癖挾驚熱者

寬熱飲痰積者白玉餅○驚食兩重四股搐搦痰壅成者
先與利驚丸消導次服啓脾散調脾○外感因驚虛風邪
乘入心肝二經或內有積熱外又感風俱謂之傷風夾驚
神困昏憤頭疼口中氣急而熱先用惺惺散參蘇飲入參
羌活散或大青膏選用微表次與天麻防風丸○通用導
赤散五福化毒丹瀉青丸腎氣丸凡驚風用水銀輕粉巴
豆芒硝鉛霜腦麝蟾酥蜈蚣等劑往往由此變成慢驚難
治况驚搖發熱若因內傷外感痲疹而作其害尤速寧用
細辛羌活青皮甘草芩蒿之類以代腦實散獨活柴胡
山柰枳殼大黃之類以代銀朱巴戟通利蓋瀉青丸治肝
熱羣衣直視或搐或不搐或臟腑發泄諸藥不止等症如
驚熱出於心肝者宜桑白皮亭蓼赤茯苓車前子山柰甘
草姜棗煎服從小便利之藥亦散能瀉肝風降心火最利
驚熱或加山柰羌活大黃又有驚癇驚癇挾一切雜症者
又當以意會之參
用各門藥可也 搐有虛實有逆順 驚風痰熱四症輕者
牙關緊急搖頭窺視張口出舌角弓反張身體掣顛手足
搐搦四股攣攣有方謂之八候凡發際印堂青筋三關虎

口紋紅紫青皆驚風之候實熱為急驚風肝木風邪有餘陽症虛熱為慢驚屬脾土中氣不足陰症慢驚本無熱所以熱者虛使然耳故曰熱分虛實○男搐左視左眼上瞤女搐右視右眼下瞤男握拳大指出外女握拳大指入裏五指交如姜把若死男引手挽左直右也女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋形勢變引入裏者順出外者逆出入相半者難痊故曰症別逆順治分先後與易難治搐先於截風治風先於利驚先於驚先於驚後一或有遺必生他症故曰治有先後雖然五臟多傳變無○急驚傷腑易治慢驚傷臟難治非痰火併其間驚邪入心則面紅臉赤夜啼入肝則面目汗多睡入肺則面色淡白喘急氣乏入腎則面黑齒乳咬牙○寅卯辰時搐者肝木旺也當以腎氣丸補腎瀉肝九○巳午未時搐者心火旺也當以腎氣丸補肝瀉心九○申酉戌時搐者肺金旺也當以益黃散補脾

真赤散抑心瀉青丸抑肝亥子丑時痛者水土俱旺之時
水虛不旺惟土旺也當以益黃散補脾導赤散涼驚丸抑
心要知五臟傳變皆痰為患蓋痰乃風苗火動則伏於脾
火動則壅於肺痰火交作則為急驚或成痲痺痰火結滯
則為癰疽或為瘰癧痰火來去則為疳積皆由脾濕而來
所以益黃丸足然用風藥不問急慢當以養血藥為使古方
保元陽加白芍一
為慢驚表劑也

急驚發搐牙關緊閉熱秘渴壅痰涎急驚入候俱全加以
口中氣亦熱作渴引飲大便秘小便赤赤熱身壯熱
內有實熱外拔風邪風熱併作氣亂痰壅所以百脉凝滯
關竅不通此時暴烈發過如救百
日內見此症二三發不止者亦死先與和氣通關竅凡搐
氣鬱氣順則痰化而搐自止矣先宜蘇合香丸薄荷煎湯
入姜汁化下順氣下痰通竅或星香散開關用前吹鼻法
或用天南星一錢片腦少許為末生薑汁
調蘸藥於左右大牙關上擦之牙熱即開次截風搐清心

田^ヲ截風丸天麻姜蠶南星各二錢蜈蚣一條白附子防風

礞砂全蝎各一錢麝香少許為末蜜丸梧子大每十九

薄荷煎湯化下治驚風痰搐○定搐散蜈蚣一條麻黃南

星白附姜蠶羌活代赭石蝎梢姜黃硃砂各一錢麝香五

分為末每一字劑芥紫蘇煎湯下治急驚○定搐如搐不止加烏蛇肉○牛黃清心丸○^カ指^ス定^ス痰^ス熱^ス尚^ス不^ス

退下之只用抱龍丸^カ膽^ス星^ス一兩天竺黃五錢辰砂雄黃各

耳草薄荷煎湯化下一丸痰壅嗽甚姜湯下人虛陽人

琥珀煎湯下蓋抱者保也龍者肝也肝應東方青龍主

魂魂安則驚自定型小兒諸驚四時感冒瘟疫熱痰邪熱

以及燥癰不安痰嗽氣急瘡疹欬吐發搐常服祛風化痰

鎮驚鮮熟和脾胃益精神又治蠱毒中暑及室女白帶用

鹽少許細嚼一二九新汲水下○牛黃抱龍丸膽星八錢

雄黃人參茯苓各一錢半辰砂一錢二分姜蠶三分鈞藤

一兩半天竺黃二錢半牛黃二分麝香五分為末用甘草

四兩煎膏和丸共實大金箔為衣陰乾藏之勿泄氣每近

微火邊每服一九或半丸薄荷煎湯磨服治一切急慢驚

風及風熱風癱等症○有熱者來驚丸忌巴豆利後溫膽

與定魄驚悸頑痰者溫膽湯加酸棗仁或硃砂安神丸○

苓遠志硃砂天麻菖蒲天門冬酸棗仁牛草各等分爲末
蜜丸如皂子大硃砂爲衣每一丸燈心薄荷煎湯化下

醒脾防變慢驚醒脾散人參白朮茯苓甘草白附子姜

煎溫服或爲丸服治小兒脾困昏
沈默默不食吐瀉不止痰涎驚風

慢驚吐瀉涎喘神緩眼閉睡露睛搐搦乍靜又乍發身

熱或冷面黃青眼半開半合似睡不啼十指或開或合似

沈身或赤或熱或吐或瀉或不吐瀉或食乳或不
不乳各半陰平陽合病如傷寒半表半裏也陰症自陽

宜細認陰症慢驚自陽症急驚傳來經吐瀉便是慢
驚男子以瀉得之爲重女子以吐得之爲重

症生胃截風形

因吐瀉得者理中湯加木香或五苓散脾

宋木附湯附子白朮各一兩肉豆蔻一箇木香甘草各五

錢每二錢姜棗煎服治吐瀉後脾虛變成慢驚身忙髮直

吐乳貪睡汗多宜此溫寒燥濕行氣健脾○因下積取轉

得者先與木香勻氣散因外感寒邪得者先與桂枝解肌

湯輩因夏月脾胃伏熱大吐瀉得者當解暑熱不可專一

回陽其他久嘔久利傷寒變陰過服寒藥之類可以類推

尚有陽症蟬蛭散

初傳尚有八候陽症在者但於生薑

白附子天麻南星輩可冷可熱均平陰陽不必專一回陽

○方傳慢驚者蟬蛭散全蝎七箇蟬退廿箇南星一箇甘

草二錢半每五分姜棗煎服○不省人事者保命丹吐瀉痰壅者來復丹若是純陰烏蝎星已

慢驚外無八候但吐瀉不止者烏蝎散人參白朮茯苓

草川烏全蝎南星各一分姜棗煎服如再服即去川烏○

厥冷回陽硫附進硫附九生附子尖二箇蝎稍七箇熟硫

黃一錢為末生薑汁為丸棗豆大

每服一錢

九米飲下兼治慢脾風肢冷或竭稍餅○金液丹靈砂丹或四君子湯加附子助胃回陽身煖破石具

五靈 風痰壅盛者古蒙石丸青礞石搗碎一兩同煨硝錢入砂鍋內炭火煨紅候冷為末蒸餅丸菜豆大每

二九急驚風荷荊芥煎湯下慢驚慢脾木香煎湯下但蒙硝雖能利痰非胃家所好故以木香佐之能裹痰隨大便

出而無糞來不動臟腑始知藥妙○痰搗忌下者靈脂九五靈脂白附子小香姜蠶各一分全蠍半分硃砂一錢南

星五錢為末醋煮生半斤和丸麻子大每三九姜湯下○安神散全蝎四箇糖水浸一宿用南星一箇開一竅入蝎

在內以南星末蓋口麩包火煨赤色埋土中一宿去火毒取出去南星用全蝎為末每一字磨刀水調服亦治搐搦

○昏迷有痰者白玉餅○凡方中麝香開竅龍腦輕粉下涎硃砂涼心皆為純陽實熱者設虛者全要斟酌用之

慢脾 風 微搗眼全閉 逐風則無風可逐療驚則無驚可療

但脾間痰涎壅熱往來眼合者脾困神迷痰涎凝滯難療亦有不由急慢風傳次而至者頭低捶睡額

汗多舌短或吐頻頻嘔口噤咬牙身冷不和以手摸人聲

又小生胃回陽奈若何初傳慢脾陽氣未甚脫者白姜無

脂各一錢為末煮半夏夏麴為糊丸如麻子大每五九姜湯

下○風盛四肢厥冷者黑附湯附子三分木香一分半白

附子一分甘草半份姜煎服得手足溫蘇省為度次以四

君子湯加附子或異功散以溫中正氣○脾困不食者醒

脾散吐瀉者加味木附湯疏附丸重者來復丹金液帛

馬脾風因肺寒甚痰嗽鼻衄症最危寒邪停留肺俞寒化

上氣肺脹欬喘俗云馬脾風若不速治立危宜抱龍丸或

馬脾風散辰砂二錢半輕粉五分甘草一錢半為末每下

字用溫漿少許上滴香油下點抄藥若只痰嗽將發搐

在油花上洗下却去漿水灌之神效

蘇合香散命丹全蝎十四箇防風南星蟬退姜黃天

麻琥珀各二錢白附子辰砂各一錢麝香五分有熱加牛
黃片腦一方加羌活為末粳米飯搗丸菓子大金箔十片
為衣初生兒半丸乳汁化下十歲已上兒二丸鈎藤燈心
煎湯或薄荷金銀煎湯化下治初生臍風撮口夜啼胎驚
內鈎肚腹堅硬目睛上視手足攣掣角弓反張痰涎壅盛
一切急驚及慢驚尚有陽症常服安神化痰如天鈎加犀
角天漿子雄猪膽汁為丸井水調化一丸入鼻內令嚏
次以鈎藤煎湯調服○凡外感夾驚亦宜此法防之

癇症

驚風三發則為癇

名

癇關五臟似驚風

心癇面赤目豎吐

舌心煩驚悸金箔

鎮心丸或鎮心丸遠志雄黃鉄粉琥珀各二錢辰砂一錢
射香五分棗肉丸黃豆大金銀箔廿片為衣每一丸麥門
冬煎湯化下○肝癇面青上竄手足拳掣攣反折散風肝
膽星二錢羌活獨活防風天麻人參荆芥川芎細辛柴胡
各一錢為末蜜丸梧子大每二九大者三四九紫蘇煎湯
化下亦治剛症○脾癇面黃直視腹滿自利妙聖丹代諸

石雄黃蝟脂辰砂杏仁各二錢輕粉麝香各一字巴豆二粒爲末棗肉九梧子大每一丸杏仁煎湯下○肺癰面白反視驚悸吐沫潮熱天星丸瞻星全蝎蟬退各二錢半防風白附子天麻姜蠶各一錢半麝香五分爲末棗肉九棗豆大每三丸荆芥生薑煎湯下○腎癰面黑晦振自視人口吐清沫如尸不動腎癰獨活麻黃川芎大黃甘草各六分姜煎服

體柔時醒與瘥別風驚食癰治不同

小兒血氣未

爲風邪所傷者名風癰屈伸如數有熱生瘥宜先疎風然後清痰散熱安神定搐散風丹○因驚者名驚癰驚怖積驚啼叫恍惚宜先治驚然後清三焦去熱化瘥紫石散或定魄丸用青黛一錢爲衣金銀薄荷川芎煎湯化下○因食者名食癰或食時遇驚停乳大便酸臭或結痞先寒後熱宜先消積然後治癰又有痰火作癰者宜吐痰瀉火安驚紫霜丸用蝟脂煎湯下之或醒脾散爲丸服○諸癰通用荆芥穗二兩白礬二兩半生半枯爲末麝香九黍米大礞砂爲衣每廿丸姜湯下○急驚三癰丹蜈蚣一條南星二錢全蝎防風遠志白附子薑薈玄胡索辰砂各一錢麝

香丁字金銀箔各三片為末糊丸梧子大每丁九紫雲膏

蒲煎湯下○慢驚來復用薄荷湯化下○二九得利即

愈凡驚風對症用藥已効若未甚蘇省可再服數九○

凡癰症方萌起耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急

為爪破須令血出啼叫尤得氣通凡漸洗兒衣不可夜露

恐為雌鳥落羽所汚染觸其間未有不為癰也挾邪怪者

其色變易不陽癰身熱陰癰冷面光脉浮病在腑易治陰

癰身冷不掣不啼伏卧面黯脉沈病在臟難治陽癰忌溫

藥陰癰忌涼藥古方治陰陽癰用代赭石火煨醋淬為末

每五分金銀煎湯下○心驚痰是上工血滯心竅邪氣在心

入金箔少許調下○通用猪心丸或竹瀝丸白木蜜

炒厚朴甘草水煎各二錢半附子犀角各一錢全蝎七箇

每箇用薄荷葉裹湯泡一時炙黃為末竹瀝丸黑豆大每

一丸金銀薄荷煎湯隨兒大小加減化服○癰後瘡不能

言者用南星濕紙煨香為末每一字雄猪膽汁調服効

○癰愈後復作者斷癰丹○冬瀉氣血不足者活虎丹

一身強硬為瘰癧終日不醒分剛柔先略語而發其有各剛

發者各柔瘰癧理中剛麻葛柔瘰癧理中湯三三三三通用斷

瘰癧命投斷瘰癧丹小續命湯

客忤

客忤異物暴觸驚心氣不足遇入客或異物則狀若癰風

眼不窺吐沫瘰癧喘腹疼雄麝千金龍膽灌雄麝散雄黃

分麝香一字為末每一字刺雞冠血調灌之仍以母衣覆身即愈或鈎藤散千金龍膽湯保命丹外用竈心土蚯蚓

等分為末醋調為丸摩兒頭及五心詳前夜啼條有中馬汗氣臭忤或馬鳴驚忤者用馬尾燒烟頻薰兒面以瘰

為度或先用姜湯調下蘇合香九次用豆豉水濕搗九雞子大摩兒顙上及足心各五六遍次摩臍心及上下良父

聲聞自有
毛即擲之

天鈞

天風外觸內熱痰痰因乳母愛酸天鈞屬陽由乳母酒

氣入乳遂令芽兒心肺生熱痰鬱氣滯加之外感天風觸動卒然目直身強如魚上釣之狀故曰天鈞

眼翻如邪崇壯熱驚搐手足抽掣眼目翻騰甚者爪甲亦

青藍通用鈞藤并保命鈞藤散人參犀角各五分全蝎天

風熱勝者保命丹痰盛者按食疎通和胃兼抱龍丸熱痰者滾痰丸

腹內跳動宜寬熱飲泄下惡臭然後與調和脾胃之藥治之此等不可誤作驚風

內鈞

內鈞內臟拍掣痛即鈞原因胎驚胎風動胎中風氣壅結兼驚而得眼

有紅筋點身反張唇黑偃啼外腎腫吐瀉方了外搗來內

外兼攻實可恐誰知至寶鈞藤膏調氣鎮驚疎風內外共

驚風內鈞腹中極痛偃啼面青肢冷尿如米泔者鈞藤膏

乳香沒藥各三錢木香姜黃各四錢木鱉肉十一箇為末

蜜調成劑收砂罐內量兒大小加減鈞藤煎湯或四磨湯

化下次服五味木香散川練肉七箇用巴豆卅五粒去皮

同炒豆黃去巴豆木香史君子玄胡索茴香各一錢為末

量兒大小加減米飲調下○內鈞冷痛者古芳歸湯加乾

姜肉桂等分丁香沈香青皮小茴減半水煎服○痛甚者

魏朮散義朮五錢阿魏一錢先用溫水化阿魏浸義朮一

晝夜焙乾為末每一字紫蘇煎湯或米飲調下○內鈞腹

痛驚啼者乳香九乳香五分沒藥沈香各一錢蝎梢十四

箇橫柳一錢半為末蜜丸梧子大每一二九菖蒲鈞藤煎

化下○內鈞陰腫便秘者歸半散○已上皆調氣疎風

之膏若驚重者宜
定魄丸以鎮之

盤腸腰曲虫嘔攻

盤腸痛因寒積小腸
亦腹痛多嘔與內釣

相似但痛則曲腰乾嘔額汗為異古方用白芷蔻砂仁青
皮陳皮香附莪朮甘草等分為末紫蘇煎湯下○虫症亦
與內釣相似但虫痛攻心叫哭合眼嘔吐涎沫清水四肢
羸瘦面青黃或寒或熱沈默不知病處發作有時為異化
虫丸主之○一切積痛盤腸虫痛者通用沈乳感應丸沈
香乳香杏仁木香丁香各一錢肉豆蔻一箇百草霜一分
巴豆十四粒為末酒煮過黃蠟和丸菜豆
大每四九姜湯或釣藤煎湯下痢疾亦宜
中風不語似三
種
大人一丁同小兒有中風後瘖不能言者用木香陳皮等
草煎湯吞肥兒丸內有黃連能去心竅惡血故也○有肺
風喘促涎潮窺視者用阿膠紫蘇烏梅人參煎服蓋阿膠
能育神驚風後眼中
瞳子不正者最宜

疝氣

疝氣亦因胎患得

有因父服熱藥以致氣滯於下者有因孕婦傷啼哭冷氣入胎中而成此疾者

有久坐濕地而得者多啼冷氣傳腎經有因兒多啼不已冷氣吸入小腹釣痛傳流腎經而得者

又有木腎有腎腫有腎癰有偏墜

有癰疝有奔豚有疝瘕與太科同面青吐沫陰囊腫甚則小便

淋瀝陰囊腫痛者用耳草汁調地龍糞塗之○風熱外腎

掀赤腫痛日夜啼叫不數日退皮如鷄卵壳愈而復作者

用老杉木燒灰入膩粉清油調敷神効小腹痛連腰背傾諸病皆因腎虛寒邪冷濕之氣侵入

腸胱之經留而不散故陰核腫硬沈墜治法先宜疏利次

用逐寒溫臟之藥按穴灸之惟木腎腎癰瘡毒之氣入於

腎經又則成膿治法外用拔毒之藥敷貼肉服消散癰毒排膿利水道等藥先宜疎導歸牛散

肉桂牽牛各五錢當歸大黃桃仁各二錢半全蝎一錢每

一錢入蜜煎服利後以青皮陳皮茯苓木香砂仁甘草生

姜煎服和胃唇青者死治疝氣

次與和胃姜金鈴散金鈴

肉一兩

便閉小腹脹甚者引痛甚夜啼

砂仁七錢半華澄茄木香各五錢為末每一錢入者二錢
塩湯或酒調服治疝痛時先曲腰乾啼脚冷唇乾額汗或
外腎釣上陰囊偏大○
通用鈎藤膏魏木散

變蒸

變則氣升蒸則熱變者變生五臟蒸者蒸養六

八蒸十變

長氣血

小兒初生形體雖具臟腑氣血尚未成就而精神
志意魂魄俱未生全故三十二日一變六十四日

一蒸凡遇一變即覺性情有異於前上唇中心有一點白
者是也初生至三十二日一變生癸水屬足少陰腎主精
至六十四日一蒸二變生壬水屬足太陽膀胱其發耳與
尻冷至九十六日三變生丁火屬手少陰心主藏神其性
為喜至一百二十日二蒸四變生丙火屬手太陽小腸
其發汗出而微驚至一百六十日五變生乙木屬足厥陰
肝主藏魂喜笑至一百九十二日三蒸六變生甲木屬足
少陽膽其發兩目不閉而赤至二百二十四日七變生辛

金屬手太陰肺主藏魄生聲至二百五十六日四蒸八變
生庚金屬手陽明大腸其發膚熱而汗或不汗至二百八
十八日九變生巳土屬足太陰脾主藏意與智至三百二
十日五蒸十變生戌土屬足陽明胃其發不食腸痛而吐
乳又手厥陰心胞絡與手少陽三焦二經俱無形狀故不
變而不蒸十變五蒸者天地之數以生成之然後生意志
能言語知喜怒故云始全也十變後六十四日為一大蒸
計三百八十四日長其經脈手足故手受血而能持物足
受血而能行立又六十四日為一大蒸計四百十八日
則言語意志有異於前又六十四日為一大蒸計五百一
十二日變蒸既畢學語倚立扶步能食血脈筋骨皆
半稟氣盛者暗合而無病症稟氣弱者乃有蒸病

潮汗微似驚輕則發熱微汗重則壯熱吐且渴重則壯熱
似驚五日乃解
肺亂而數

或吐或汗或煩帝燥渴七八日始解與傷寒相似亦有變
蒸之後續感寒邪者如蒸於肝則目昏微赤蒸於肺則嘔
嗽毛聳隨治貴平和汗下微者微虫之不可妄治宜平和
症調治

飲子白茯苓一錢半人參甘草各五分升麻二分煎受
粉加白朮一錢水煎服變蒸前後三日各進一服可免百
病及百日內亦宜○吐瀉不乳多啼者種氣散木香香附
厚朴人參陳皮藿香甘草各等分姜棗煎服○宿乳者紫
霜丸○痰熱柴胡當歸寒熱湯骨熱心煩啼叫不已者柴
胡飲柴胡人參麥門冬甘

草各二分龍膽草防風各一分水煎服○有寒無熱者當
歸湯當歸四分木香桂枝人參甘草各二分姜棗煎服○
蒸熱甚者紫陽黑散○積
熱寒熱如瘧者梨漿飲

龜背附解廬顙填顙陷滯顙

龜背肺熱百合丹 姪孕及乳子時多食五辛炙博淹藏生

受熱也行動喘乏但遇風寒或多食則痰嗽氣急喘滿腹
體瘦悴久而不治將成疳勞之疾百合丹主之○大黃二分
天門冬杏仁百合木通桑白皮餅葶藶石羔各五錢
煉蜜丸如菉豆大每服一十五丸食後臨卧熱水化下

龜背客風松藥驗

嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓所致或小兒坐早偻僂背高如龜背

成痼疾間有灸肺俞膈俞炷粟米大艾三五壯收功內服

松藥丹松花枳壳防風獨活各一兩麻黃前胡太黃桂心

各五錢為末煉蜜丸如黍米大每服十丸或二十丸粥飲

下量兒大小加減用之或外以烏龜尿點脊骨縫中効

解顫原是腎家虛

小兒年大頭縫開解而不合腎主腦髓為腦海腎氣有虧腦髓不足所致凡

隨欠少如木無根不過十日終成痿人宜腎氣丸或八物

湯加酒炒莽連外用南星白欬為末醋調攤紅帛上烘熱

貼之或顫頭骨燒灰油調敷縫中外作頭布遮護其父母

宜服腎氣丸虎潛丸得精血充足發育子女無是患也

風熱顫填脾虧陷

顫填者顫門腫起也脾主肌肉乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘脾以致臟腑

不調其氣上衝填脹顫高而突毛髮短黃自汗若寒氣上

衝則牢鞞宜溫之熱氣上衝則柔軟宜涼之劑量輕重兼

與調氣又有肝盛風熱交攻以致顫填突起者瀉青丸如

因發熱者驚風印至○顫陷者顫門成坑也治同臟腑有

熱酒飲水漿致成泄利久則氣血虛弱不能上充腦髓
顛陷如坑不得平滿宜黃狗頭骨炙黃為末鷄子清調敷
滯頤熱者胃火炎冷涎胃弱不收斂滯頤者口涎流出而
稠粘者乃胃火炎上也宜通心飲或瀉黃散加減○冷涎
自流者乃胃虛不能收斂也宜木香半夏丸木香半夏丁
香各五錢白姜白朮青皮陳皮各二錢半為末
蒸餅丸麻子大一歲下丸二歲倍之米湯灌下

五軟五硬

五軟皆因稟受虧行遲語遲齒髮遲

五軟者頭項軟手軟

○頭軟頭不能正詳腎痺條○項軟天柱倒也有吐瀉久
弱者宜補脾胃有傷寒不及發表成者難治○有肝膽伏
熱面紅唇紅肌熱者羊角散羚羊角白茯苓原膠骨酸棗
仁桂心熟地防風甘草各等分為末每一錢酒調服或涼
肝丸防風二錢人參赤茯苓各一錢半黃芩羌蔚子黑參
太黃知母各一兩為末蜜丸棗豆大量兒大小食後茶清

下兼治痘後目赤腫痛○有風氣入肝筋舒頭項軟者天
杜九蛇含石一塊火煨醋淬七次欖金麝香各少許為末
飯丸龍眼核大每一丸荊芥煎湯或金銀薄荷煎湯化下
○通用健腎散單姜蠶炒為末每三五分薄荷泡酒調服
治久患痺疾體虛不食及諸病後天杜骨倒○外用生筋
散木鱉子六箇草麻子六十箇俱去壳搗爛先抱起兒頭
摩項上令熱後用津液調勻貼之○貼項方生附子南
星等分為末生薑自然汁調敷頸項軟處○手軟無力以
勤也所受肝弱兩手筋縮不能舒伸○意苡丸薏苡仁當歸
秦艽酸棗仁防風羌活各一兩為末蜜丸芡實大每一丸
至二九麝香荊芥煎湯化下○脚軟行遲乃骨髓不滿氣
血不充筋弱不能束骨宜腎氣丸加牛膝二加皮鹿茸五
六歲不能行者羊角九鈴羊角虎脰骨生地酸棗仁白茯
苓各五錢桂心防風當歸黃芪各一錢半為末蜜丸皂子
大每一丸或三九溫酒化下三歲不能行者用五加皮一
兩牛膝木瓜各五錢為末每一錢米飲入酒少許調服○
有脚指蹇縮無力不能伸展者海桐散海桐皮牡丹皮骨
歸熟地牛膝各二分山茱萸補骨脂各一分葱煎服○六

鶴節風俗云鼓樓風乃腎虛精髓內耗為風邪所襲皮膚
不氣日漸枯瘁如鶴脚之節宜腎氣丸加五加皮鹿茸牛
膝○身軟肉少皮枯白離飲食不為肌膚四君子湯緊皮
丸通身筋軟者鹿茸四片九加當歸青鹽各等分○口軟
語遲嬰兒在胎母卒有驚怖驚氣乘胞絡之經使生子心
神不足古本不通四五歲猶不能言菖蒲九石菖蒲入參
麥門冬遠志川芎當歸各二錢乳香硃砂各一錢為末蜜
九麻子大每十九米飲下○諸病後不能語者鷄頭九雄
鷄頭一箇鳴蟬三箇俱炙焦太黃川芎甘草各一兩八參
木通各五錢當歸黃芪遠志麥門冬各三分為末蜜九小
豆入每五九空心米飲下夕服取効○齒遲因稟氣不足
則髓不能充腎宜腎氣丸或十全大補湯加知母黃柏外
用當歸川芎芍藥山藥沉香甘草各等分為末搽齒齦上
仍可白湯調服單方雄鼠屎廿粒每日用一粒搽齒齦上
至廿一日當生○髮遲乃血氣不能上榮髮落丸肉裡蓉
川芎當歸芍藥熟地各等分胡粉減半為末蜜九黍米大
每十九黑豆煎湯下仍化抹頭上○已上皆因稟受不
足或因吐瀉後致若可以補助脾胃失治必成無辜篤疾

五硬強直本風症若兼腹硬兼積醫

五硬者頭項四肢強直米冷乃肝受風邪

也宜小續命湯烏藥順氣散主之○腹大骨痛不寬者五積散加烏藥莢蠶積消氣和則愈若心腹俱硬面青者死

丹毒附胎瘡

丹毒遊行走遍身病因濕熱逼心君

丹名不一皆由母食

或不甚乾即着熱熱侵淫心火驟盛以致毒熱血搏而風乘之所以赤腫遊行遍身不定其始發於手足或頭面即背令人煩悶腹脹其熱如火痛不可言若入小腹陰囊如青傷者死按毒涼肌審起處治法

針破夫血外用長毒涼肌之藥敷○從頭項上起用葱白然汁塗○從頭項上紅腫痛用赤小豆為末鷄子清調塗

○從面上赤腫用龜心土末鷄子清調塗○從背起用桑白皮末羊脂調塗○從兩背赤腫黃色槐木燒灰水調塗

○從兩脇虛腫用生鐵剉末入猪糞水調塗○從臍上腫起用檳榔為末米醋調塗○從兩脚赤腫起用乳香為末

羊脂調塗○從兩脚赤白點起用猪槽下土為末豬油調
 塗○從陰上起用犀角屑土為末羊脂調塗○錢氏通用
 村硝土硃為末監製淨萍水苔同研終汁調塗或用村硝
 一兩大黃五錢為末新汲水調時時塗掃○凡丹毒變易
 非輕如經三日不
 治攻入臟腑即死入裏內消可救入毒氣入裏腹脹則死
 消當歸煎片或茄蒂亦好甘草羌活黃芩各五錢麝香五
 分為末每二錢生地黃煎湯調服○通用五福化毒丹犀
 角消毒飲四順清涼飲人參敗毒散加紫草或升麻葛根
 湯加白木茯苓木香枳殼大抵以清心火去濕熱為主勿
 妄用毒陷有不可服胎毒必先化其毒次用父便刷如神一
 煎藥者懼懼散炒胎毒必先化其毒次用父便刷如神一
 歲生瘡遍身先服五福化毒丹或犀角消毒飲外用父小
 便驚銅離刷濕者青黛末乾糝更與丹毒通用條茶看

內傷乳食類

吐瀉
腹脹

五疳
脹痞

諸積
脹黃

癖病
腹痛

八刺

乳救

喘

尿白

汗多

吐瀉

吐瀉初生怎可當

脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不止久則變成慢驚與疳○初生惡物未

下但嘔黃汁者木瓜丸木瓜賦粉木香檳榔麝香各等分
 為末麪糊丸小豆大每一二九甘草煎湯下○初生吐瀉
 不定者珠砂丸珠砂南星巴霜各等分為末糊丸黍米大
 每二九薄荷煎湯灌服下之後以珠沈煎調之珠砂二錢
 藿香三錢滑石五錢丁香十四粒為末用新汲水一盞煮
 油滴成花抄藥五九在上須臾墜下澄去水別用溫水下
 ○初生吐瀉壯熱不思乳食大便秘色白或不通者停乳也
 先宜紫霜丸下之後用香橘餅木香橘皮青皮各二錢半
 厚朴神麩麥芽砂仁各五錢為末蜜丸芩實大五九下
 蘇煎湯米湯化下或加肉豆蔻訶子二九冷積泄瀉俱
 效
 治者先分身熱涼寒吐腥臊瀉青白熱吐酸臭瀉色黃
 初生及續長嬰兒吐瀉以身涼面黃瀉青白吐腥臊者為
 內傷寒乳或外感風寒以身熱面赤瀉黃赤吐酸臭者為

內傷熱食或外感暑熱○古方吐瀉身來者觀音散○吐瀉身熱作渴者錢氏白朮散○吐瀉身溫或作寒下熱不

思乳食或食乳難化大便青白此上實下虛也先宜益黃散後宜四君子湯隨五臟見症加減如吐瀉肢厥顛倒加

藿香丁香脾虛生風多困加半夏麴冷石子及冬瓜子少許驚啼驚縱睡卧不安加全蝎鉤藤白附子赤白朮加歸

芍藥米白朮加乾姜粟泄瀉加陳皮厚朴傷風加川芎防風羌活細辛發渴加乾葛枇杷葉及木瓜少許

必定增寒熱傷風多作吐瀉風木好侵脾土故也外症必

先服大青膏或鉤藤散發散後服益黃散補脾冷者先服益黃散補脾後服大青膏或鉤藤散發散如吐瀉或瀉

殺者乃傷風甚被濕腹脹溺不長利平胃散主之虛者異

也大半夏湯攻散○吐瀉作渴瀉者五苓散○壯熱體重吐酸瀉寒瀉者濕熱熱也羌活黃芩蒼朮甘草等分水煎溫服

多腹痛暑必渴寒月吐瀉白色不渴者益黃散腹痛者理中丸肢冷加附子○久不止者沒有子丸

殺石子一箇、白豆蔻五箇、訶子二箇、木香、黃連各一錢、爲末、飯丸、麻子大、每十五丸、米飲下、兼治痢、瀉、瀉、○暑月吐瀉、色黃、引飲者、誘行丸、或玉露丸、石、寒、水、石、各一兩、耳、草五錢、爲末、糊丸、黃豆大、每一丸、冷水下、吐不止、姜湯下、○久不止者、古連栢丸、黃連、黃栢各一兩、爲末、入猪膽汁、內煮丸、菰豆大、每廿丸、米飲下、○換論二症、多見於夏、秋、如立夏前後、濕熱時行、暴吐瀉者、蘇葛湯、夏至後吐瀉、身熱、或傷乳食、瀉深黃者、益元散、合四苓散、加蒼朮、爲末、溫水調服、太暑後吐瀉、身溫、或傷乳食、瀉深黃、白者、食前服益黃散、食後服益元散、立秋後吐瀉、身涼、不食、多睡、多嘔、不渴者、類服益黃散、少服益元散、秋分後吐瀉、身冷、不食、瀉青褐色者、益黃散、瀉臭、乳食必傷、內傷乳食不化、面黃、腹脹、瀉如抱、嬰、鷄、卵、臭者、消乳食、丹、丁香、木香、青皮、肉豆蔻、三稜、莪朮、各等分、爲末、糊丸、麻子大、每五丸、米飲下、○小、便、不、清、者、胃、茶、湯、加、肉、豆、蔻、爲、丸、米、飲、下、○腹、痛、吐、乳、者、平、胃、散、合、蘇、合、香、丸、蜜、調、米、飲、下、○按、痰、者、二、陳、湯、加、山、查、麥、芽、白、木、烏、梅、熱、加、黃、連、寒、加、乾、姜、○危、甚、者、燒、針、丸、黃、丹、一、兩、或、加、枯、礬、等、分、爲、末、蜜、

